

고함량 콘드로이틴(400mg)+활성비타민

콘비400정

- 관절통
- 신경통
- 근육통
- 허리 관절통
- 어깨 관절통
- 육체 피로
- 눈의 피로

콘비400정은 관절의 주요성분인 콘드로이틴설페이트나트륨과 심전대사를 활성화시키는 비타민B군으로 처방되어 신경통/관절통/근육통/눈의 피로 등으로 고생하시는 분들의 증세를 완화시켜 하루를 가볍게 시작할 수 있게 도와주는 제품입니다.
특히 1정 당 함량을 400mg으로 증량시키고, 1일 1회 복용으로 편의성을 향상시킨 제품입니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

콘드로이틴설페이트나트륨(KPC)	400mg
푸르실티아민(KPC)	60mg
니코틴산아미드(KP)	50mg
피리독신염산염(KP)	25mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
γ-오리자놀(KPC)	5mg

첨가제 (타르색소) : 황색 4호, 적색 40호, 청색 1호

첨가제 (동물유래) : 콘드로이틴설페이트나트륨 <기원> 소, 사용부위 : 연골>

유당수화물 <기원> 소, 사용부위 : 우유>

[성상] 임갈색의 장방형 필름코팅정

납알식별정보 : IBN

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 B군보조 : 육체피로, 임신 수유기, 병중 병후의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민의 효능효과는 다음과 같습니다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등)
 - 각기, 눈의 피로

[용법·용량]

8세 이상 어린이 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 않습니다.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 만 3개월 미만의 영아
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 만 1세 미만의 영아
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 임부, 수유부
- 4) 이 약은 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로, 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자는 신중히 투여합니다.

3. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오 : 구역, 구토, 설사, 붉은 변, 구내염, 식욕부진, 복부팽만감
- 2) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(Neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 3) 고용량 투여에 의해 소화장애를 촉진시키고 당내성 손상(Glucose tolerance impairment 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurismia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
5. 상호작용 - 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않습니다 : 레보도파
6. 임상검사치에의 영향 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장성의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여 보관하십시오.
- 3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

[포장단위] 60, 120정

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- 본 약품들은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.
- 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회의 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
- 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담전화 02-843-1500에서 확인할 수 있습니다.
- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(ozdruk.kfda.go.kr)의 의약품정보를 참조하십시오.
- 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭→보고마당→안전성정보→의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- 본 제품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.
- 본 제품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 본 제품과 함께 보관하십시오.
- 본 제품에 대한 의문사항은 소비자상담전화 02-843-1500으로 문의하십시오.
- 제조자 :  兩儀製藥 경기도 이천시 부발읍 가산리 491-7

· 판매자 :



BORYUNG

보령제약

경기도 안산시 단원구 신갈동 1122-3
www.boryung.co.kr

<작성일자> 2011년 05월 13일