

황산콘드로이틴 나트륨 300mg 함유

뉴콘틴

연질
캡슐



일반의약품
복합제
316
KGMP 인증업체

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

황산콘드로이틴트륨(KPC)	300mg
• 기원동물 : 소 • 사용부위 : 연골	
푸르셀티아민(KPC)	15mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
니코틴아미드(KP)	10mg
판토텐산칼슘(KP)	10mg
피리독신염산염(KP)	10mg
시아노코발라민(KP)	30μg
토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 50IU)	50mg
감마오리자놀(KPC)	5mg

첨가제 (타르색소) : 황색5호, 적색40호

첨가제 (동물유래) : 젤라틴 : 소 (가축내피)

【성상】 황색의 내용물이 충전(채움, 메움, 충전, 충만)된 주형색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민(E, B1, B2, B6)의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절염(요통, 건통(어깨결림, 어깨통증) 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기
 - 눈의 피로

【용법·용량】 성인 및 8세 이상의 어린이 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 1세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부, 수유부
 - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당(이자)염 등 질환자 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 이상반응
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 위부 불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 붉은 변, 구내염(입안염), 식욕 부진, 복부 팽만감
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 알레르토젠을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증(혈관 막힘증)의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 정기복용하면 갑

각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.

- 폴산이 부족한 환자에게 비타민B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 장애를 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 정해진 용법·용량을 잘 지켜나.
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도감독하에 투여합니다.
- 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에는 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검 할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체포매질이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 상호 작용

이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용(사용)) 투여하지 않습니다.

- 레보도파
- 임상검사치에의 영향
이를 황색으로 변화시켜 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 지장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아)하여 보관합니다.
 - 오용(잘못사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60캡슐, 120캡슐

*본 의약품은 KGMP에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

*제품에 관한 문의는 전화(02-561-4011)로 하시기 바랍니다.

*약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

*의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) -> 정보마당 -> 의약품등정보를 참조하세요.

*제조의회사 : 수혈생명과학(주) -경기도 안산시 단원구 낙대동 448-2

*제조사 : (주)동주제약 -경기도 화성시 향남면 상리리 901-3

*판매자 : (주)대웅생명과학 -서울 강동구 성내1동 469-6

작성년월일 : 2011년 05월 26일

