

의약품 분류번호	114 해열·진통·소염제
-------------	------------------

일반의약품

8가지 한방성분강화

신한방 화쿨[®]

소청룡탕건조엑스 캡슐

원료약품의 분량 1캡슐 중

소청룡탕건조엑스(별규).....	200mg
아세트아미노펜(KP).....	150mg
티페피딘하이드로클로라이드(KP).....	12.5mg
클로르페니라민말레산염(KP).....	1.25mg
카페인무수물(KP).....	12.5mg

성상 암갈색의 분말이 든 상하 갈색의 불투명한 캡슐제

효능·효과 감기의 증상상(여러 증상) (코물, 코막힘, 재채기, 목의 통증, 기침, 가래, 오한(춡고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

용법·용량 성인(만15세 이상) : 1회 2캡슐
만11세 이상~만15세 미만 : 1회 4/3캡슐
만7세 초과~만11세 미만 : 1회 1캡슐
1일 3회, 식후 30분 이내에 복용하십시오.

사용상의 주의사항

- 경고

1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 마십시오.
이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있습니다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안됩니다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
 - 만 3개월 미만의 영아(젖먹이)
 - MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
 - 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염 (코염)용경구제, 알레르기약)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의하십시오.
 - 만 3개월 미만의 영아(젖먹이)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영(젖먹이)·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 합니다. 만 2세 미만 영(젖먹이) : 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터 해야 합니다.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 부종(부기), 위십이지장궤양, 녹내장 (예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고있는 사람
(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
 - 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 누)곤란, 목마름 (지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
 - 이 약의 복용에 의해 다음에 아래의 증상(심한 증상) 증상이 나타난 경우
(1) 속(나니필락시) : 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
(2) 피부점막인중후군(스티븐스-존슨중후군), 중독성표피괴사증후군(레일중후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있습니다.
(3) 천식 (4) 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있습니다.
(5) 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타납니다.
(6) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있습니다.(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용 할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.)
(7) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등이 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.
 - 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오. 2) 장기간 계속 복용하지 마십시오.
 - 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오. 4) 복용시에는 음주하지 마십시오.
 - 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
 - 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.
 - 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드제 이뇨제(트리클로로메타이드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용하십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

포장 단위 12캡슐(12캡슐 / PTP포장 X 1)

저장 방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

제조원 제이더블유중외제약(주) / 충남 당진시 송악읍 한진1길 56

제 조 자 정우신약(주) / 충남 아산시 신창면 서부남로 790번길 60

교환 및 제품문의

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락처/고객만족팀 1588-2675

※ 첨부문서 작성년월일 : 2016년 05월26일 이후 변경 시 3년 당사 홈페이지 (www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조원

중외제약
제이더블유중외제약(주)
충남 당진시 송악읍 한진1길 56

신한방화쿨설명서-1610-A