

# 메가600정

## 【원료약품 및 분량】아약 1정중

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 코르로이틴실페이트나트륨(KPC) .....                 | 600mg |
| 푸르실티아민염산염(푸르실티아민으로서 54.97mg)(KPC) ..... | 60mg  |
| 니코틴아미드(KP) .....                        | 50mg  |
| 피리독신염산염(KP) .....                       | 25mg  |
| 판토텐산칼슘(KP) .....                        | 15mg  |
| 리보플라빈부타레이트(KP) .....                    | 6mg   |
| γ-오리지놀(KPC) .....                       | 5mg   |
| 클린타르타르산염(DAB) .....                     | 20mg  |
| 0.1%시아노코발라민(시아노코발라민으로서20μg)(KPC) .....  | 20mg  |
| 이노시톨(KP) .....                          | 20mg  |

## 【성상】진한 갈색의 장광형 필름코팅성

## 【효능 효과】

- 다음 경우의 비타민 B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>의 보급
- 육체피로 - 임신·수유기
- 병중·병후 회복을 앞는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
- 각기 - 눈의 피로

## 【용법 용량】12세 이상 및 성인 : 1일 1회 1정 복용

## 【사용상 주의사항】

### 1. 다음환자에는 투여하지 말 것

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유용정용, 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 심한증상의 신부전 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

### 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의약을 복용하지 말 것

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2 레보도파

### 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 5) 심장·순환기계장애 장애 환자

- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 강심배당체를 투여 중인 환자

### 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우.  
- 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염, 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 지혈안, 얼굴열아름, 심박동불규칙, 피부발진, 어지러움, 얼굴·다리 종창(부기)
- 2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B<sub>12</sub>를 1일 40 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 우혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우.
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우.

### 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 4) 독차, 용차 등 탄산을 함유하는 차는 복용중, 복용 전후에는 피할 것

### 6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보증을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

### 【저장방법 및 사용기간】기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

### 【포장단위】지사포장단위

- ※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염 되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 제품설명서 최종 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 (<http://ezdrug.kda.go.kr>)의 정보마당을 통해 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 사용자에게서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오. 어린이 손에 닿지 않게 보관 하십시오.
- ※ 제품문의처 : 02-3485-0434