

기능성 종합영양제

하노백[®] Hanobac Plus 플러스



[제품명] 하노백플러스정

[성분 · 함량] 이 약 1정(1329.24mg) 중

토코페롤아세테이트50%(KPC)	40mg비타민E로서 20.0 IU)
니코틴 산아미드 (KP)	50mg
리보플라빈부티레이트(KP)	5mg
제피아스코르브산(KPC)	618.56mg(아스코르브산으로서 600mg)
피리독신염산염 (KP)	5mg
셀레늄함유건조효모(KPC)	27.23mg(셀레늄으로서 35.40 _{μg})
시아노코발라민0.1%(KPC)	24mg(시아노코발라민으로서 24 _{μg})
산화아연(KP)	37.35mg(아연으로서 30.0mg)
산화마그네슘(JP)	50mg(마그네슘으로서 30.15mg)
판토텐산칼슘 (KP)	20mg
클레칼시페롤과립(KPC)	2.5mg(비타민D로서 250.0 IU)
폴산 (KP)	0.4mg
푸르실티아민염산염(KP)	30mg(푸르실티아민으로서 27.49mg)
α-비오틴(EF)	0.2mg

[성상] 흰색의 정방형 필름코팅정입니다.

[효능 · 효과]

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 1) 육체피로
- 2) 임신 · 수유기
- 3) 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시
- 4) 발육기
- 5) 노년기
- 6) 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.

- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨결림, 어깨통증) 등)
- 각기
- 눈의 피로
- 햇빛 · 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
- 잇몸출혈 · 비출혈(코피) 예방

2. 아연의 보급

[용법 · 용량] 만 12세 이상 어린이 및 성인: 1회 1정씩 1일 1회 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 과칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 만 1세 미만의 영아
- 5) 신결석 환자
- 6) 중증(심한 증상)의 신부전 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피한다.
- 3) 과수산노증환자(hyperoxaluria: 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 4) 임부, 수유부
- 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장애(신장장애) 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 감심배당체를 투여 중인 환자
- 9) 위장관 질환

3. 부작용

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. - 구역, 구토, 설사, 위 부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진, 홍반(붉은 반점), 부전수축, 중추신경계 기능저하, 피부부, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화 장애, 상복부통증, 폐부종, 어지러움, 얼굴·다리종창(부기))
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 엽산(폴산)이 부족한 환자에게 비타민B12를 1일 10mg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 골절증이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여합니다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.

5. 상호작용

- 1) 황알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 사용)투여하지 않습니다.
 - 가) 안산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 나) 레보도파
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

- 1) 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

7. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 100정

[최신정보 확인 방법]

이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.donga.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조의뢰자

 **東亞製藥**  **동아제약**

본사 : 서울특별시 동대문구 용두동 252

공장 : 충청남도 천안시 차암동 404

제조사

 **KOLMAR**

한 국 콜 마

충남 연기군 전의면 신정리 618-3

HANP-IG001

첨명서 작성년월일 : 2011. 7

* 사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 의약품은 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002(고객콜심), 02-920-8279(제품문의)