

에스클러캡슐

(세파클루수화물)

Esclor Cap. (Cefaclor Hydrate)

전문 의약품
분류번호 618

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1캡슐 중

- 유효성분 : 세파클루수화물(별규) 250 mg (역가)
- 첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색3호
- 첨가제(동물유래성분) : 캡슐 중 젤라틴(소, 내피 및 돼지, 껍질)
- 기타 첨가제 : 스테아르산나트륨, 전분글리콜산나트륨, 크로스카르멜로오스나트륨, 캡슐

[성상] 흰색 또는 황백색의 결정성 분말이 충전된 상부 보라색, 하부 흰색의 경질캡슐제

[효능·효과]

- 유효균종
페렴연쇄구균, 인플루엔자균, 포도구균, 스트렙토кок쿠스 피오케네스(그룹A-베타용활성), 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 클레브시엘라, 임균
- 적응증
- 중이염
- 폐렴, 인후두염, 편도염, 기관지염
- 신우신염, 방광염, 임균성 요도염
- 부수렴, 중증, 모낭염, 전조지염, 감염성 죽종, 피하농양, 생인선, 창상감염

[용법·용량]

- 성인 : 세파클루수화물로서 1회 250mg(역가)을 8시간마다 경구 투여한다. 중증감염증(폐렴 등)과 감수성이 낮은 감염증의 경우 2배로 증량 투여할 수 있다. 급성 임균성 요도염의 경우 이 약 3g과 프로베네시드 1g을 단위 병용 투약한다.
- 소아 : 1일 체중 Kg당 20mg(역가)을 8시간마다 분할 투여한다. 중증감염증, 중이염 및 감수성이 낮은 감염의 경우에는 1일 체중 Kg당 40mg(역가)을 투여할 수 있으며 최대용량은 1일 1g(역가)이다.
- 신기능 손상 환자 : 용량 변화 없이 투여할 수 있다.
베타용활성 연쇄구균감염의 치료는 적어도 10일간 투여해야 한다

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 의하여 속의 병력이 있는 환자
 - 2) 이 약 또는 세파클루수화물과 관련된 과민반응의 병력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 페니실린계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 2) 본인 또는 부모형제가 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질인 환자
 - 3) 중증의 신장에 환자
 - 4) 경구섭취가 불량한 환자 또는 비경구영양 고, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰한다.)
 - 5) 위장관질환의 병력이 있는 환자(특히 대장염)
3. 이상반응
 - 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 충분히 관찰하고 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 2) 과민반응 : 아나필락시안 증상(전신홍조, 부종, 호흡곤란, 맥관부종, 감각이상, 실신, 고혈압, 혈관확장), 발진, 두드러기, 홍반, 가려움, 발열, 림프절 종창, 관절통, 혈청병양 반응(발진, 다형홍반, 관절염, 관절통, 발열은 수반되거나 수반되지 않음), 등이 나타날 수 있으며 이러한 증상, 징후들은 투여를 시작한 후 며칠 이내에 나타나서, 투여 종료 후 며칠 이내에 소실된다. 항히스타민 및 코르티코이드는 회복을 도와준다.
 - 3) 피부 : 스티븐스-존슨증후군, 독성표피괴사증후군이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 4) 혈액계 : 때때로 무과립구증, 과립구 감소 또한 드물게 범혈구 감소, 빈혈, 철소빈 감소, 호산구 증가, 림프구 증가, 백혈구 감소, 재생불량성빈혈, 용혈성 빈혈, 가역적 호중구 감소 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 5) 간장 : 드물게 일시적인 간염, 황달, 때때로 AST, ALT, ALP의 상승이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
 - 6) 신장 : 가역적 간질성 신염, 드물게 BUN 상승, 혈청크레아티닌 상승, 급성 신부전 등의 중증의 신장장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 몇몇 세파클루수화물계 항생물질은 특히 신장에 환자에게 용량을 감량하지 않고 투여 시 발작이 야기될 수 있다. 발작이 약물치료와 관련이 있다면 약물치료를 중단해야 하고 임상적으로 필요할 경우 항경련제를 투여한다.
 - 7) 소화기계 : 드물게 위장장애(팽만 등)의 발현을 수반하는 중증의 대장염이 나타날 수 있다. 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 또한 때때로 구역, 구토, 설사, 복통, 위부불쾌감, 가슴쓰림, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.
 - 8) 호흡기계 : 다른 세파클루수화물 투여 시 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구 증가 등을 수반하는 간질성 폐렴, 호산구성 폐렴 등 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 코르티코이드 투여 등 적절한 처치를 한다.
 - 9) 중추신경계 : 드물게 가역적인 기능항진, 초조, 불안, 과다근육 긴장증, 신경과민, 불면, 착란, 어지러움, 환각, 졸음 등이 나타날 수 있다.
 - 10) 균과대중 : 드물게 구내염, 칸디다증이 나타날 수 있다.

- 11) 비타민결핍증 : 드물게 비타민 K 결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)이 나타날 수 있다.
- 12) 기타 : 드물게 두통, 생식기 가려움, 질염, 질 도뇨박막 등이 나타날 수 있다.
- 13) 서방형의 임상시험결과와 추가된 임상반응은 다음과 같다.
- 혈액의 상차, 식욕부진, 불안, 관절통, 전신, 기관지염, 흉통, 오한, 울혈성심부전, 결막염, 변비, 어지러움, 월경통, 소화불량, 배뇨곤란, 귀의 통증, 부종, 발열, 복부팽만감, 위염, 감염, 불면증, 기분변화, 발진, 관대, 월경증상, 근육통, 이뇨, 구토, 목의 통증, 신경질, 아노증, 중이염, 통증, 삼계항진, 호흡곤란, 부비동염, 졸음, 말, 발림, 두드러기
4. 일반적 주의
- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성군의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.
- 2) 속 등의 반응을 예측하기 위해 충분한 모니터링.
- 3) 다른 항생물질들처럼 이 약에 내성된 미생물들에 의한 중독 감염이 발현될 가능성을 고려해야 하고, 이러한 경우에는 적절한 치료법을 선택해야 한다.
5. 상호작용
- 1) 프로베네시드와 병용투여 시 이 약의 세노분 배설 속도가 감소되어 혈중농도를 지속시킬 수 있다.
- 2) 신독성이 있는 항생물질 또는 이노제푸로세미드, 에타크리산산을 병용투여 시 신장기능이 증가될 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 3) INR(국제정상화비율)의 변화 : 이 약을 포함한 항생물질을 항응고제와 동시에 투여 받은 환자에서 항응고 활성의 증가가 보고되었다. 감염성질환(그리고 염증성 과정을 동반한), 환자의 연령과 일반적 인 상태는 위험요소가 된다. 비록 이 약과 와파린의 상호작용이 임상시험을 통해 밝혀지지 않았지만 INR 모니터링을 실시하여야 하고, 필요한 경우 경구용 항응고제의 용량을 적절히 조절한다. 항생물질의 일부 종류류, 특히 플루로퀴놀론, 마크로라이드, 사이클린, 코트리복사솔과 일부 세팔로스포린의 경우는 더 심하다.
- 4) 경구 피임약과 병용투여 시 피임의 효과가 감소시킬 수 있으므로 다른 피임법을 추가로 사용하는 것이 바람직하다.
- 5) 정균성 항생물질(클로람페니콜, 에리스로마이신, 테트라사이클린 등)과 병용투여 시 이 약의 살균작용을 감소시킬 수 있다.
6. 알약 및 수유부에 대한 투여
- 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 모유로의 소량 이행이 보고되어 있으므로 수유부에는 신중히 투여한다. 500mg 단일 용량 투여 후, 세파클러의 소량이 모유에서 발견되었다. 혈중 평균 농도는 2, 3, 5시간 후 각각 0.18, 0.20, 0.16mg/L이었으며 1시간 후에는 극미량에 되었다. 수유에 대한 이 약물의 영향은 알려지지 않았으므로 수유부는 주의하여 이 약을 사용해야 한다.
7. 소아에 대한 투여
- 1개월 이하의 신생아에 대한 유효성 및 안전성은 확립되어 있지 않다.
8. 고령자에 대한 투여
- 고령자에 투여할 때는 다음과 같은 점에 유의하고, 용량 및 투여간격에 유의하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.
- 1) 생리기능이 저하되어 있어 이상반응이 발현하기 쉽다.
- 2) 비타민 K 결핍으로 출혈을 일으키기도 한다.
9. 임상감사에서 대한 영향
- 1) 테스타스테로 반응을 제외한 베네딕트약, 펠링시약, 클리니테스트에 의한 요양감사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 2) 직접 쿨스시험 양성 나타날 수 있으므로 주의한다.
10. 기타
- 이 약은 세포벽의 필수적인 특정 단백질과 결합하여 세포벽 합성을 저해함으로써 살균작용을 한다.
11. 의약품동등성시험 정보⁹⁹⁾
- 시험약 세파클러수화물캡슐 250밀리그램(※경보제약)과 대조약 시클러캡슐250밀리그램 [(주)대웅제약]을 2×2 시험하으로 각 1캡슐씩 각각한 성인에게 공복 시 단회 경구 투여하여 28명의 혈중 세파클러를 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로그 변환하여 통계처리 하였을 때, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log 0.80에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		1차 평가항목		2차 평가항목	
		AUC _{0-∞} (ug·h/mL)	C _{max} (ug/mL)	T _{max} (h)	t _{1/2} (h)
대조약	시클러캡슐250밀리그램(세파클러수화물) [(주)대웅제약]	11.16±1.40	8.621±2.580	0.75 (0.50~1.50)	0.72±0.10
시험약	세파클러수화물캡슐250밀리그램 [(주)경보제약]	10.95±1.46	8.646±2.999	0.75 (0.50~3.00)	0.70±0.07
90% 신뢰구간* (기준 : log0.8~log1.25)		log0.9483~ log1.0106	log0.8562~ log1.1007	—	—

(AUC_{last}, C_{max}, t_{1/2} : 평균값±표준편차, T_{max} : 중앙값(범위), n=28)

AUC : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 까지의 혈중농도-시간곡선면적적

C_{max} : 최고혈중농도

T_{max} : 최고혈중농도 도달시간

t_{1/2} : 말단 소실 반감기

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

⁹⁹⁾ 이 약은 (주) 경보제약의 세파클러수화물캡슐250밀리그램과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 (주)경보제약에 위탁제조한.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30캡슐/병, 300캡슐/병

[제조사] (주)경보제약 / 충청남도 아산시 실옥로 174

[제조의뢰자] (주)다산제약 / 충청남도 아산시 도고면 덕암산로 381

[제품문의처] 080-850-5206

※ 본 의약품은 GMP의약품 제조 및 품질관리기준에 의하여 엄격한 관리를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.

※ 의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여야 합니다.

※ 이 첨부문서 개정연월일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약품안전관리원에서 할 수 있습니다.

— 신청방법: 전화신청(1644-6223, 14-3330) 또는 홈페이지(karp.drugsafe.or.kr)

— 신청대상: 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족

— 보상방법: 사망일시보상금, 장애비, 장애일시보상금, 진료비

첨부문서 개정 연월일 : 2024년 12월 23일

[PM1120/01]