

기침 / 가래

속콜코프엘

연질
캡슐

속콜코프엘연질캡슐은 상부 기도의 바이러스 감염(목감기) 등에 의해 나타나는 기침, 가래의 증상에 빠르게 작용하여 치유하는 속효성 진해거담제입니다. 특히, 속콜코프엘연질캡슐은 신속히 흡수되는 액상형 연질캡슐의 형태로 생체이용률을 높이고, 항히스타민제(알러지 개선), 진해제(기침억제), 기관지 확장제(가쁜 호흡 증상의 개선) 등을 복합 처방하여 기침, 가래 등의 목감기 증상에 우수하고 빠른 효과를 발휘하도록 개발된 제품입니다.

[주요성분의 약리작용]

- **덱스트로메토르판브로모화수소산염수화물**: 연수의 기침중추억제
- **노스카핀염산염수화물**: 일칼로이드로서 진해중추에 작용하여 기관지를 확장
- **트리메토쿠놀염산염수화물**: 선택적으로 β_2 수용체를 자극, 기관지를 확장시켜 천식이나 만성 폐쇄성 폐질환의 기도폐쇄성 장애에 의한 호흡곤란 등 증상의 완화
- **구아이페네신**: 위점막을 자극하고 호흡기계 분비를 자극함으로써 호흡기계의 체액량을 증가시키고 점액질의 점도를 감소시켜 거담제로 작용
- **클로르페니라민말레산염**: 위장관, 혈관, 호흡기계에 위치한 H1수용체에 히스타민과 경쟁적으로 작용하여 히스타민 유도성 혈관 확장을 억제하며 모세혈관 투과성을 저해하고 말초혈관을 수축시켜 감기, 비염, 상기도염에 수반되는 콧물, 코막힘, 재채기, 기침 및 알러지 증상의 개선

성상 미향색 내지 적색의 투명한 내용물을 함유한 적색의 투명한 타원형 연질캡슐

성분 · 함량	1캡슐 중
	덱스트로메토르판브로모화수소산염수화물(KP) 10.00mg
	노스카핀염산염수화물(KP) 10.00mg
	트리메토쿠놀염산염수화물(KP) 1.00mg
	구아이페네신(KP) 50.00mg
	클로르페니라민말레산염(KP) 2.00mg
	첨가제(동물유래성분): 젤라틴(2년생 미만, 미국산 소의 가죽)

효능 · 효과 기침, 가래

용법 · 용량 성인: 1회 1캡슐씩 1일 3회, 식후 30분에 복용하십시오.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.
다른 진해(기침을 그치게 함)거담(가래)제, 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멀미약, 알레르기용약), 진정제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.
 - 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우라도 만 2세 미만의 영(갓난아기) · 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용하지 마십시오. 만 2세 미만 영(갓난아기) · 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링하십시오.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음

식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

- 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 감상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란(소변불편) 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 6) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 7) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 찬식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨곤란(소변 불편), 목마름(지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면

- 2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

- 2) 만 7세 이하의 영(갓난아기)·유아에게는 시럽제를 복용시키십시오.

- 3) 복용 시에는 음주하지 마십시오.

- 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.

- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.

- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

포 장 단 위

자사포장단위

저 장 방 법

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 하십시오.

※ 첨부문서 개정연월일(2011.06.03) 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 설명서 개정연월일 : 2011.06.03

P1105-01

제조의회사 :

 **일양약품주식회사**

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.lyang.co.kr

제조자 :



알앤피코리아(주)

경기도 화성시 향남읍 상신리 906-6