

속콜플러스

연질캡슐

성 상

흰색 또는 옅은 적색의 내용물이 충전된 적색의 장방형 연질캡슐제

성분 · 함량

1캡슐 중
아세트아미노펜(KP) 300.00mg
카페인무수물(KP) 30.00mg
구아이페네신(KP) 80.00mg
dl-메틸에페드린염산염(KP) 20.00mg
클로르페니라민말레산염(KP) 2.50mg
첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(평균 6개월령, 미국산 돼지의 가죽)
첨가제(타르색소) : 적색 40 호

효능 · 효과

감기의 증상상(여러증상)(코물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

용법 · 용량

성인 : 1 회 1 캡슐씩 1 일 3 회, 식후 30분에 복용하십시오.

사용상의 주의 사항

1. 경고

- 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 4) MAO 억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.

진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멀미약, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 하십시오.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이지후군의 초기 증상일 수 있으므로) 의사와 상의하십시오.)
- 2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영(갓난아기)·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용하지 마십시오. 만 2세 미만 영(갓난아기)·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란(소변불편) 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가

지고 있는 사람

7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)

9) 다음과 같은 기침이 있는 사람

출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

발진·발적(총혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 누)곤란(소변불편), 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면

2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한증상) 증상이 나타난 경우

① 속(아나필락시스)(과민성쇼크): 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.

② 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사용해(리엘증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(총혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있습니다.

③ 천식

④ 간기능 장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있습니다.

⑤ 간질성 폐렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타날 수 있습니다.

3) 5~6 회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

2) 장기간 계속 복용하지 마십시오.

3) 복용 시에는 음주하지 마십시오.

4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.

5) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장반감기를 증가시킬 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

포 장 단 위

자사포장단위

저 장 방 법

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자 분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 의약품용 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 하십시오.

※ 첨부문서 개정연월일(2011. 06. 03) 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인할 수 있습니다.

설명서 개정연월일: 2011. 06. 03

P1106-01

제외의뢰자 :

 **일양약품주식회사**
경기도 용인시 기흥구 하갈들 182-4
소매(자상당실) 080-021-1010(수신자료금부담전화)
학술상담실 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

제조사 :

 **알앤티코리아(주)**
경기도 화성시 향남읍 상산리 906-6