

광범위 설사 치료제 후라베린큐엑스정

일반의약품

분류번호 237
(정장제)

광범위한 지사제 후라베린큐엑스정은 설사의 주요원인인 소화불량성 설사, 세균성 설사에 모두 도움이 될 수 있는 광범위 설사치료제입니다. 과식이나 소화불량 또는 여행지에서 나타나는 다양한 원인의 설사에 후라베린큐엑스정이 도움을 드립니다.

원료약품의 분량 (1정중)

아크리놀수화물(KP)	14.0mg
베르베린염화물수화물(KP)	36.0mg
스코폴리아엑스(KP)	5.0mg
(총 알칼로이드로서 0.05mg)	
비스무트차질산염(USP)	150.0mg
(비스무트로서 109.5mg)	
우르소데옥시콜산(KP)	5.0mg
첨가제(타르색소: 황색203호, 청색1호)	

성상

이 약은 녹색 원형 필름코팅정입니다.



효능·효과

설사, 복통을 수반하는 설사, 식제(食滯)(체함), 묽은변, 토사(吐瀉).

용법·용량

성인 1회 2정, 8~14세 1회 1정, 1일 3회 식후에 복용합니다. 복용간격을 4시간 이상 둡니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후
복용하시기 바랍니다.

- 다음 환자는 복용하지 마십시오.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부, 산생아
- 다음 환자는 신중히 복용하십시오.
 - 약으로 알레르기 증상[발진, 발적(腫熱되어 붉어짐), 가려움증]을 일으킨 일이 있는 환자
 - 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자(노인), 합병 환자 또는 잠복변이 계속되는 환자
 - 위·십이지장궤양 등이 있는 환자
 - 소아
 - 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 부작용
 - 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 이 약을 투여하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타날 수 있습니다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
 - 급성의 심한 설사를 할 경우 또는 구역, 복통, 복부팽만 등의 증상을 수반하는 설사를 할 경우에는 이 약으로 무리하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있으므로 이러한 경우에는 복용에 대하여 약사 또는 의사와 상의하십시오.
 - 복용 시에는 음주하지 않습니다.
 - 수회 간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
 - 3일 이상 계속하여 복용하지 않습니다.
- 상호작용

위장진동·진경제와 병용투여(함께 복용)하지 않습니다.

- 소아에 대한 투여

이 약은 7세 이하의 영아(갓난아기), 유아는 복용하지 않습니다.
- 저장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 되도록이면 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

20정

○ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

○ 이 설명서는 2012년 1월 26일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

ILDONG 일동제약주식회사

본사: 서울특별시 서초구 바우포로27길 2 (전화) 02-526-3114
공장: 경기도 안성시 공단1로 25
소비자상담실: (전화) 080-022-1010(수신자부담)