

아웃콜복 캡슐

[성상] 인공색의 분말이 든 상하부 황색의 경질캡슐

[성분 · 함량] 1캡슐 중

덱스트로메토르판브로부프로산염수화물(KF)	7.5mg
황판엑스산(KF)(황판으로서 187.53mg)	21mg
염화리소질(KF)	10mg
길경엑스산(KF)(길경으로서 199.8mg)	54mg
이세티미드(KF)	120mg
에텐자미드(KF)	100mg
클로르페니라민말레산염(KF)	125mg
동물유래성분: 유당수화물(KF)/소유	

[효능 · 효과] 감기의 증상상여 증상(코막힘, 재채기, 인후목구멍통, 기침, 가래, 오한)을 줄여주는 증상, 발열, 두통, 관절통, 근육통의 완화

[용법 · 용량] 만 15세 이상: 1회 2캡슐

만 11세 이상 - 만 15세 미만: 1회 1캡슐

만 8세 이상 - 만 11세 미만: 1회 1캡슐

1일 3회 식후 복용

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

[사용상주의사항]

경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대해 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 현식을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) 4) MAO 억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제) 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 5) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

진해기침을 그치게 하기(담배가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염코염용 경구제, 알비약, 알레르기약, 디펜히드라민을 함유하는 제제)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 이하(아구역이나 구토)를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것) 2) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우 만 2세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) · 유아에게는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용하지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(젖먹이, 갓난아기) · 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모나 태해야 한다. 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 천두통, 음식물알레르기

등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에: 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람

5) 간질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위산이정제(위산 억제제), 녹내장: 눈의 통증, 눈의 침침함 등) 배뇨소변을 늘려준 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람

6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장 문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈 문제를 가지고 있는 사람

7) 알부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)

9) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

발진 · 발적(붉어짐) · 발진(발진), 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨소변을 늘려준, 목이 붓거나(목이 붓거나) 심한, 어지러움

2) 이 약의 복용에 의해 다음의 중증심한 증상(증상)이 나타난 경우

① 속(아나필락시스): 복통 후 비로 두드러기, 부종(부기), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식욕부, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부종반(중증)과(중증) 존슨 증후군, 중독성 표피괴사(중증) 증후군: 고열을 동반하고, 발진(발적)되어 붉어짐, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신(전신)에 나타나거나, ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다. ⑤ 간질성 폐렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.

3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

2) 장기간 계속 복용하지 말 것.

3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것

4) 복용시에는 음주하지 말 것.

5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.

6) 비록(비록) 약을, 심하게 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 이세티미드(이세티미드)를 대사하는 능력이 감소되어 이세티미드의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것(밀봉 안의 내용은 필요할 경우에 기재할 것)

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 자사포장단위

[고객상담실] 02-574-2541

본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

2011년 07월29일 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.