

고함량 비타민 **하이타민정** **HITAMIN**

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효성분 :	
직타용아스코르브산97%(별규).....618.6mg	니코틴산아미드(KP).....100mg
(아스코르브산으로서 600mg)	피리독신염산염(KP).....6.07mg
토코페롤아세테이트2배산(KP).....60mg	시아노코발라민(KP).....12μg
(비타민E로서 30IU)	판토텐산칼슘(KP).....30mg
폴산(KP).....400μg	d-비오틴(USP).....45μg
티아민질산염(KP).....24.76mg	황산아연수화물(USP).....65.58mg
리보플라빈(KP).....10mg	(아연으로서 23.9mg)
■ 첨가제(동물유래) : 유당수화물(가원동물:소, 사용부위:우유)	
■ 첨가제(타르색소) : 청색1호알루미늄레이크, 적색4호, 황색5호알루미늄레이크	
■ 기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 크로스포비돈, 탈크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프록셀로오스	

[성상] 갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

- 다음경우의 비타민 B1, B2, B6, C의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하, 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 햇빛·피부병 등에 의한 색소 침착기미, 주근깨의 완화
 - 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방
- 아연의 보급

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태) 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 4) 심장·순환기계기능 장애 환자 5) 신장(콩팥)장애 환자 6) 저단백혈증 환자 7) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석에 있는 환자 8) 이 약은 황색5호선셋염료로 FCF, Sunset Yellow FCF를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 위장관창자장애, 소화장애, 상복부(배부분) 통증, 저혈압, 폐부종(부기) 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전혈관 막힘성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전혈관 막힘증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다. 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고

당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사 하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨 혈증, 울혈성부전, 부정(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 9) 항알도스테론제, 트리암 테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 10) 우발적으로 과량복용 한 경우 1) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 90정/병, 100정/병, 500정/병 **[사용기간]** 제조일로부터 36개월

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 **[소비자상담실]** 02)521-2308

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 이 문안은 (2018년 6월 14일) 작성되었으며 이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품정보는 미래제약 홈페이지(<http://www.miraepharmkorea.co.kr>) 또는 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어아 하며 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
※ 부작용 보고 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

Rev_01

제조사 :  **미래제약**
경기도 안성시 공단2로 104