

발사원정 40 밀리그램 / 80 밀리그램 / 160 밀리그램 (발사르탄)

[원료약품 및 그 분량]

발사원정 40mg : 1정(82.00mg) 중	
• 유효성분 : 발사르탄(USP)	40.00mg
• 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 크로스포비돈, 크로스카르멜로오스나트륨, 하이드록시프로필셀룰로오스, 경질무수규산, 스테아르산나그네슘, 오파드라이노락세(03B62323)	
발사원정 80mg : 1정(164.0mg) 중	
• 유효성분 : 발사르탄(USP)	80.0mg
• 첨가제(타르사스) : 청색2호알루미늄레이크, 황색5호알루미늄레이크	
• 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 크로스포비돈, 크로스카르멜로오스나트륨, 하이드록시프로필셀룰로오스, 경질무수규산, 스테아르산나그네슘, 오파드라이분홍색(03B84614)	
발사원정 160mg : 1정(328.0mg) 중	
• 유효성분 : 발사르탄(USP)	160.0mg
• 첨가제(타르사스) : 청색2호알루미늄레이크, 황색5호알루미늄레이크	
• 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 크로스카르멜로오스나트륨, 크로스포비돈, 하이드록시프로필셀룰로오스, 경질무수규산, 스테아르산나그네슘, 오파드라이 노락세(03B62479)	

[성 상] 발사원정 40mg : 분할선이 있는 노란색의 타원형 필름코팅정 발사원정 80mg : 연한 노란홍색의 원형 필름코팅정 발사원정 160mg : 연한 황색색의 타원형 필름코팅정

[효능 효과]

- 본태고혈압
- 심부전 : ACE억제제에 불내성(intolerant)인 심부전(NYHA class II ~ IV)
- 심근경색 후의 사망 위험성 감소 : 증상, 중증 혹은 병사생화적으로 좌심실 부전 및/또는 좌심실 수축 기능 부전을 가진 임상적으로 안정된 환자에서의 심근경색 후 사망 위험성 감소

[용법·용량]

1. 본태고혈압

식사 중 등과 함께 복용하거나 식간에 복용한다. 가능하면 매일 같은 시간(예, 아침)에 복용할 것이 권장된다.

- 성인 : 성별, 인종에 상관없이 발사르탄으로 1일 1회 80 mg 경구투여가 권장된다. 혈압강하 효과가 2주 이내에 점진적으로 나타나며 주 이후 최대효과를 나타낸다. 혈압조절이 잘 되지 않는 환자는 용량을 1일 160 mg까지 증가하거나 1노제를 병용투여 할 수 있다. 만약, 추가적인 혈압 강하가 필요할 경우, 1일 최대 320 mg까지 용량을 증량할 수 있다.
- 고령자(75세 이상) : 이 약으로서 1일 1회 40 mg으로 투여를 시작한다.
- 신장에 환자 :
 - 크레아티닌청소율 20 ~ 50 mL/min : 용량 조절이 필요하지 않다.
 - 크레아티닌청소율 10 ~ 20 mL/min : 이 약으로서 1일 1회 40 mg으로 투여를 시작한다.
 - 크레아티닌청소율 10 mL/min 미만 및 투석환자 : 이 약을 투여하지 않는다.
 - 혈액 내 체액 부족 환자 : 혈액 내 체액이 부족한 환자의 경우에, 고용량의 이노제 복용환자로 용량을 감할할 수 없는 경우, 이 약으로서 1일 1회 40 mg으로 투여를 시작한다.
- 간장애 환자 : 경증 및 중증도 간장애 환자인 경우 이 약으로서 1일 1회 40 mg으로 치료를 시작하여, 1일 80 mg을 초과해서는 안된다. 중증의 간장애, 간경화, 담낭정체환자에게 이 약을 투여하지 않는다.
- 소아 : 18세 미만 소아 및 청소년에서 안전성, 유효성이 확립되어 있지 않다.

- 심부전

성인 : 개시용량은 이 약으로서 1일 2회, 1회 40 mg 경구투여가 권장되며, 1회 80 mg 또는 160 mg까지 증량할 수 있다. 이노제 병용 투여시 이노제의 용량감소를 고려해야 된다. 1일 최대 투여 용량은 320 mg으로 분할 투여한다. 이 약은 ACE억제제와 베타 차단제의 3종 병용투여는 권장되지 않는다.

3. 심근경색 후의 사망 위험성 감소

성인 : 심근경색 발현 후 12시간 이내에 투여를 시작할 수 있다. 개시용량은 이 약으로서 1회 20 mg씩 1일 2회로 시작하는 것이 권장되고, 이후 주 주에 걸쳐 이 약을 1회 40 mg, 80 mg, 160 mg을 1일 2회 투여하는 방식으로 환자의 내약성을 고려하여 용량을 증량한다. 저혈압 증상 또는 심부전이 나타날 경우 강함을 고려한다. 심근경색 후 다른 투여(예, 혈전용해제, 이세티실리산산, 베타 차단제 및 스타틴 계열 약물)으로 치료 중인 환자에도 이 약을 투여할 수 있다. 그러나 ACE억제제와의 병용은 권장되지 않는다.

4. 신장애 환자 : 크레아티닌청소율 10 mL/min 이상인 경우 용량조절이 필요치 않으나, 크레아티닌청소율 10 mL/min 미만 및 투석환자에 대한 사용경험이 없으므로 이 약을 투여하지 않는다.

5. 간장애 환자 : 경증 및 중증도의 간장애 환자에 대한 이 약의 1일 투여량은 1일 80 mg을 초과하지 않는 것이 바람직하다. 1일 80 mg 이상을 투여하는 경우, 용량 증량 시 치료의 유의성이 위험성을 상회 하지는 않다고 한다. 중증의 간장애, 간경화, 담낭정체환자인 경우 이 약을 투여하지 않는다.

6. 소아 : 18세 미만 소아 및 청소년에서 안전성, 유효성이 확립되어 있지 않다.

[사용상의 주의사항]

- 경고

임부에게 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 직접 작용하는 약물들의 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지도 일어날 수 있으며, 이러한 사례는 ACE억제제를 복용한 환자에서도 세계적으로 수십 개가 보고된 바 있다. 따라서 만일 임신으로 확인될 경우 즉시 이 약의 투여를 중단해야 한다(임부 및 수유부에 대한 투여'항 참조).

- 다음 환자에게는 투여하지 말 것.
 - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 중증의 간장애 환자, 간경화증 또는 담도폐쇄, 담낭정체 환자
 - 유전성 혈관부종 환자(이러나, ACE억제제 혹은 안지오텐신 II 수용체 길항제 치료시 혈관부종의 병력이 있는 환자
 - 중증의 신장애 환자(크레아티닌청소율 10 mL/min 미만)(사용경험이 없다.)
 - 원발알도스테론증 환자(원발고알도스테론증 환자는 레닌-안지오텐신-알도스테론계가 활성화되지 않기 때문에 이 약을 투여하지 않는다.)
 - 당뇨병이나 중증도~중증의 신장애 환자(사구체여과율 < 80mL/min/1.73m²)에서 알리스키렌 함유제제의 병용
- 다음 환자(경우에는 신중히 투여할 것)
 - 고령자 2) 고혈압질환 환자 혹은 혈청 칼륨치가 높아지기 쉬운 환자
 - 경증 ~ 중증도 간장애 환자(경증 및 중증도의 간장애 환자에 대한 이 약의 1일 투여량은 80 mg을 초과하지 않는 것이 바람직하다.)
 - 대동맥관 및 승모판 협착증 환자 혹은 폐쇄미대심근경 환자
 - 5) 허혈 심장병, 허혈 심장질환과 질환, 뇌혈관 장애 환자(과도한 혈압강하는 심근경색이나 뇌혈류 부전으로 인한 뇌졸중을 일으킬 수 있다.)
 - 고용량의 이노제 투여와 같은 나트륨 또는 체액 부족 환자(이 약 투여가 드물게 저혈압 현상이 나타날 수 있다.)
 - 7) 양측성 또는 편측성 신동맥 협착증 환자(레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 미치는 다른 약물을 투여한 경우 혈중 요소 및 혈청 크레아티닌을 증가시킬 수 있으므로 안전성 면에서 모니터링이 권장된다.)
 - 심부전 또는 심근경색 후 환자 : 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 활성에 의존하는 환자(예, 중증의 심부전에게 ACE억제제 또는 안지오텐신 수용체 길항제(ARB)의 투여는 소변간소증 및/또는 진행성 고갈성혈증 및 (드물게) 급성 심부전 및/또는 사망과 관련이 있다. 심부전 또는 심근경색 발생 후 환자에 대한 평가에는 신기능 평가를 항상 포함해야 한다.)
 - 혈액투석 중인 환자, 엄격한 염분 제한요법(low-salt therapy) 중에 있는 환자(저용량부터 투여하기 시작하고 증량을 하는 경우에는 환자 상태를 충분히 관찰하면서 서서히 행해야 한다.)
 - 수술 전 24시간 이내의 환자
 - 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단 : 안지오텐신 수용체 길항제(ARB), ACE 억제제 또는 알리스키렌 등 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 영향을 미치는 다른 약제와의 병용은 권장되지 않는다.
 - 발사원정160밀리그램은 황색4호(선살레토염 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
 - 발사원정80밀리그램은 황색4호(타르트라진, Tartrazine)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 이상반응
 - 고혈압 치료

이 약으로 치료받은 고혈압 환자 2,316명을 포함한 위대조시험에서 전반적인 이상반응 발생율을 비교하였다. 다음 이상반응 표는 12주 이상 동안 여파 용량의 발사르탄(10 ~ 320 mg)으로 치료받은 10건의 임상시험을 바탕으로 한 것으로 2,316명 중 1,281명 및 660명이 각각 80 mg, 160 mg을 투여 받았다. 이상반응 발생율은 이 약의 용량, 치료기간, 성별, 나이, 인종등 무관했기 때문에 1 % 이상의 발생율을 보인 다음 이상반응은 시험과정의 인과관계에 상관없이 다음 표에 포함시켰다.

가타 : 1 % 미만 이상반응은 부종, 무력증, 불면증, 발적, 식욕감퇴, 어지럼(vertigo)등이며 이 약과의 인과관계는 밝혀지지 않았다.

	발사르탄 N=2,316 (%)	위약 N=888 (%)
두통	9.8	13.5
어지럼(dizziness)	3.6	3.5
바이라스 감염	3.1	1.9
상부기도 감염	2.5	2.4
기침	2.3	1.5
가래	2.1	1.8
피로	2.1	1.2
비염	2.3	2.3
부비동염	1.9	1.6
배통(요통)	1.6	1.4
복통	1.6	1.6
구역	1.5	1.0
인두 염	1.2	0.7
관절 통	1.2	1.0

- 심부전 환자

발사르탄 심부전 연구(Val-HeFT)의 4개월을 포함한 단기간의 이중맹검 연구에서 다음의 약물관련 이상반응이 위약치료 환자보다 발사르탄 치료 환자에서 빈번하게 1 % 이상의 발생율로 관찰되었다.
 : 어지럼, 저혈압, 기립어지럼, 피로, 설사, 두통, 구근, 신기능 손상, 고칼륨혈증, 모든 환자는 심부전을 위해 이노제, 디기탈리스, 베타 차단제 또는 ACE억제제를 포함한 다중요법으로 치료 받았다. Val-HeFT의 장기 데이터에서 단기 연구동안 이미 알려진 것 이외의 다른 이상반응은 나타나지 않았다.

3. 심근경색 후 환자

심근경색 후 고위험 환자군에 대해 발사르탄, 칸토프릴 및 발사르탄과 칸토프릴을 장기 투여 시 각각의 유효성 및 안전성을 비교한 다국적, 다기관, 이중맹검, 무작위, 대조와 비교 평형 그룹 연구인 VAIANT 결과 발사르탄의 안전성은 해당 연구군(예, 심부전 환자)과 약물 자체 성질, 심혈관계 위험요소, 심근경색 후 상태에서 치료받은 환자들의 임상적 위험 상황 등에 부합하였다. 중대한 이상반응은 주로 심혈관계 반응이었으며, 일반적이지 않은 질환과 연관되어 있었다. 이는 알지작 평가 지표였던 모든 환자에 의한 사망을 결과에도 반영된다. 시험 약물과의 연관성이 의심되는 빈도수가 0.1 % 이상이며 발사르탄 투여군에서 칸토프릴 투여군보다 더 흔하게 나타나지는 치명적이지 않은 중대한 이상반응은 고칼륨혈증, 기립, 심부전, 저혈압, 혈관신장부종, 신기능 손상에 관련된 반응들이었다. 이상반응으로 인해 투약을 완전히 중단한 환자의 비율은 발사르탄 투여군에서 5.8 %, 칸토프릴 투여군에서 7.7 %였다.

4. 와외의 임상시험 및 사판 후 조사결과 다음과 같은 이상반응이 나타났다.
 - 심부전, 부정맥, 졸음, 심방세동, 구토, 변비, 구진, 식욕부진, 권태감
 - 매우 드물게 혈관부종, 발적, 가려움, 혈청병, 혈관염을 포함하여 다른 과민성/알레르기 반응, 신기능 손상, 심신, 비출혈, 간염, 부정맥
 - 간질성 폐렴 /발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 x선 이상 증을 동반하는 간질성 폐렴이 나타나지는 일이 있으므로, 이러한 경우에는 투여를 중지하고, 부신피질 호르몬제의 투여 등, 적절한 처치를 행하여야 한다.

- 저혈당 : 특히, 당뇨병 치료 중인 환자에서 저혈당 증세가 나타나는 경우가 있기 때문에, 관찰을 충분히 하여 혈당간, 공복강, 식은땀, 손떨림, 집중력 저하, 경련, 의식장애 등이 나타났을 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 행하여야 한다.
- 혈관부종(혈관, 인두, 혀 부종 등의 증상), 간염, 심부전과 같은 이상반응이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 고칼륨혈증 : 심각한 고칼륨혈증 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다.
- 쇼크, 실신, 의식 소실 : 쇼크, 혈압강하에 따른 실신, 의식 소실이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 차가운 나트륨, 구토, 의식 소실 등이 나타날 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다. 특히 혈액 투석, 엄격한 염분 제한요법, 이노제 투여중인 환자에서 저용량에서 투여를 시작하고 증량하는 경우에는 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 서서히 한다.
- 혈문근공해증 : 근육통, 무력감, 크레이프티나-이제(CK) 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 혈문근공해증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 경우에는 투여를 중지 하고 적절한 처치를 한다.
- 이 외 무과립구증, 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 이상이 인정되는 경우 즉시 적절한 처치를 실시한다.
- 수소성 파우명 (빈도 불명)
- 살형성질 검사
 - 이 약을 투여받은 환자 0.8 %, 0.4 %에서 각각 적혈구응적, 헤모글로빈이 20 %이상 감소했다. 대조적으로 위약투여군 0.1 %에서도 적혈구응적, 헤모글로빈 감소가 나타났다.
 - ACE억제제로 치료받은 환자의 1.6 %에서 호중구감소증이 관찰된 반면 이 약으로 치료받은 환자에서는 1.9 %에서 관찰되었다.
 - 고혈압 환자군 대상으로 한 대조 임상시험에서 혈청 크레아티닌, 칼륨, 총 빌리루빈치의 상당한 증가가 관찰되었는데 ACE억제제로 치료받은 환자에서는 각각 1.6 %, 6.4 %, 12.9 % 증가가 관찰된 반면 이 약으로 치료받은 환자에서는 각각 0.8 %, 4.4 %, 6 %증가하는 것이 관찰되었다. 발사르탄을 투여받은 본태고혈압 환자는 특별한 실험실적 수치 모니터링이 필요하지 않다.
 - 심부전 환자에서 50 %이상의 혈청 크레아티닌 농도 증가는 위약 그룹(0.9 %보다 발사르탄 치료그룹(3.9 %에서 더 많이 관찰되었다. 또한 20 %이상의 혈청 크레아티닌 농도 증가는 위약 그룹 (5.1 %보다 발사르탄 치료그룹(10 %에서 더 많이 관찰되었다. 심부전 연구에서 BUN의 50 % 이상 증가는 위약 그룹(6.3 %보다 발사르탄 치료그룹(16.6 %에서 더 많이 관찰되었다.
 - 임상검사에서 대한 자료

때때로 2간기능 검사치의 상승이 보고되었으나 이 약을 투여하는 본태고혈압 환자에 대해 특별한 임상검사치의 모니터링이 필요한 정도는 아니다.
- 국내 사판후 조사결과

국내에서 재사용하여 6년 동안 1171명을 대상으로 실시한 사판 후 조사 결과 이상반응의 발현종류들은 인과관계와 상관없이 7.00 %(82/1171례)로 보고되었으며 이중 3.07 %(36/1171례)가 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사되었다. BUN증가가 0.85 %(10/1171례)로 가장 많았고, 그 다음은 두통, 어지럼, 기침이 각각 0.43 %(5/1171례), 부종 0.17 %(2/1171례), 경직, 무릎 0.08 %(1/1171례)의 순으로 나타났다. 사판 전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로 소화불량, 빈혈, 이명(이 각각 2례, 간장경직, 운동기능 감소증, 혼미, 흉통, 발진, 근육통이 각각 1례씩 보고되었다).

5. 일반적 주의

- 이 약의 투여에 의해 투여 후 약 1시간이 걸리는 혈압강하(실신 및 의식 소실 등을 동반할)을 일으킬 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 또한 특히 다음 환자에서는 저용량에서 투여를 시작하고 증량하는 경우에는 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 서서히 한다.
 - 혈액 투석중인 환자
 - 이노제를 투여중인 환자(특히 심한 나트륨 부족 혹은 체액 부족 환자에서는 드물게 중추성 저혈압이 발생할 수 있으므로 주의한다.)
 - 엄격한 염분 제한 환자
 - 고용량의 이노제를 복용하여 심한 나트륨 고갈이나 체액 고갈이 있는 환자의 경우 이 약 투여 초기에 드물게 저혈압 현상이 나타날 수 있다. 이 약 투여 전 이러한 나트륨 및 체액의 고갈은 이노제 용량을 감소하는 등의 방법으로 보정해야 한다. 저혈압이 발생한 경우 환자를 반듯한 자세로 놓고도 필요하다면 생리식염수 주사액을 적정주입한다. 혈압이 안정된 후 약물투여를 계속한다.
 - 신동맥 협착증 환자 : 각각 편측성 신동맥협착을 수반하는 신혈관성 고혈압 환자 12명에 대한 이 약의 단기투여 시 신장의 혈액 동맥학, 혈청 크레아티닌, BUN의 유의성 있는 변화는 유도되지 않았다. 그러나 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 미치는 다른 약물을 양측성 또는 편측성 신동맥 협착증이 있는 환자에 투여한 경우 혈중 요소 및 혈청 크레아티닌을 증가시킬 수 있으므로 안전성 면에서 모니터링이 권장된다. 양측성 또는 편측성 신동맥 협착 환자에서는 신혈류량의 감소와 사구체 여과압의 저하에 의해 급속하게 신기능을 악화시킬 우려가 있으므로 치료 부득이하다고 판단되는 경우를 제외하고는 투여를 피한다.
 - 경증 및 중증도의 간장애 환자에 대한 이 약의 1일 투여량은 80 mg을 초과하지 않는 것이 바람직하다. 이 약 대부분 비면혈제로서 담즙으로 배설되며 담도폐쇄 환자에서는 낮은 제거율을 나타내었으므로 이러한 환자들은 사용되지 않는다. 경증에서 중증도 간장애 환자에게 이 약 투여시 혈장 농도가 건강한 성인에 비해 약 2배 상승하는 것으로 보고된 바 있다.
 - 이 약을 투여받는 심부전 또는 심근경색 발생 후의 환자는 주로 혈압이 감소하지만 지속적인 저혈압 증세 때문에 치료를 중단할 필요는 없다. 심부전 환자 또는 심근경색이 발생한 후 환자의 치료 개시 시 주의해야 한다. 레닌-안지오텐신-알도스테론계 저해剂和, 민감한 환자에서 신기능 변화가 예상된다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론계의 활성에 의존하는 중증의 심부전 환자에게 ACE억제제와 안지오텐신 II 수용체 길항제와 치료하는 것은 소변간소증 및/또는 진행성 고갈성혈증 및 (드물게) 급성 심부전 및/또는 사망과 관련 있다. 유사한 결과들이 이 약에서도 보고된 적 있다. 심부전 또는 심근경색 발생 후 환자에 대한 평가에는 신기능 평가를 항상 포함해야 한다.심부전 환자에서 ACE억제제, 베타 차단제 그리고 발사르탄의 3종요법은 권장되지 않는다. 베타 차단제와 ACE억제제를 동시 투여하면 심부전으로 인한 이환율과 사망률이 증가하기 때문이다.몇몇 심부전 환자에서 BUN, 크레아티닌 및 칼륨 수치의 증가가 관찰되었다. 이러한 현상은 주로 경미하고 일시적이며, 기존에 신손상을 지니고 있던 환자들에서 나타날 가능성이 높다. 이 약 및/또는 이노제의 용량 감소 및 투약 중단을 고려해야 한다.
 - 고칼륨혈증 환자에서는 고칼륨혈증을 악화시킬 우려가 있으므로 주의. 불가피하다고 판단되는 경우를 제외하고 투여를 피한다. 또한 신장기능장애, 당뇨병 등에 의해 혈청 칼륨치가 높아지기 쉬운 환자 에서는 고칼륨혈증을 발현시킬 수 있으므로 혈청 칼륨치에 주의한다.
 - 최근 신장기능을 실시한 환자에 대해서는 사용경험이 없다.
 - 다른 혈압강하제와 마찬가지로 감압작용에 의해 어지럼, 휘청거림 등이 나타날 수 있으므로 운전이나 기계류를 조작할 때는 특별히 주의해야 한다.
- 상호작용

- 임상적으로 유의한 약물상호작용은 없었다. 시메티딘, 와르파린, 푸로세미드, 디곡신, 이데루벤, 인도메타신, 히드로클로로티아지드, 알프리딘, 글리벤크클라미드와의 상호작용에 대한 임상시험이 있었다. 시메티딘과 시, 발사르탄의 전신 노출이 증가할 수 있으며, 글리벤크클라미드와 병용시 발사르탄의 전신 노출이 감소할 수 있다. 이는 유전적 있는 정도까지 대시되지 않기 때문에 임상적으로 CYP-450 효소계의 대사유로에 대하여는 약물관리 상호작용이 나타나지는 않을 것으로 예측된다. 이 약은 혈장단백에 대해 높은 결합력을 보였지만 체내 내 연구에 의하면 디알로페나, 푸로 세미드, 와르파린과 같이 단백결합이 높은 약물에 대해 어떤 상호작용도 나타나지 않았다.
- 칼륨보전이노제(스피로노락톤, 트라말라젠, 이미로라이드나) 칼륨보충제 또는 칼륨함유 염류제 혹은 칼륨농도를 증가시킬 수 있는 약물(예, 헤파린) 병용시 혈청 칼륨 농도가 증가하거나 심부전 환자 에서 혈청 크레아티닌 농도가 증가할 수 있으므로 신중해야 한다.
- 안지오텐신 II 수용체 길항제가 비스테로이드소염진통제(NSAID)(예, 선택적 COX-2억제제, 이세티실리산산) 3 g/day), 비선택적 비스테로이드소염진통제)와 병용시 혈압강하효과가 감소할 수 있다. ACE억제제와 같이, 안지오텐신 II 수용체 길항제와 비스테로이드소염진통제의 병용은 신기능을 악화, 급성 심부전을 유발시킬 수 있고, 혈청 칼륨을 증가시킬 수 있다. 병용시 주의해야 하며, 특히 고령자 혹은 유효혈액량 감소환자(이노제 치료 중인 환자를 포함)는 주의한다. 병용치료 시작 후에 환자에게 적절한 수분이 공급되어야 하며, 신기능을 주기적으로 모니터링 해야한다.
- 리튬제제와 ACE 억제제 또는 이 약을 포함한 안지오텐신 I 수용체 길항제와 병용투여로 혈청 리튬 농도 및 독성의 가역적 증가가 보고되었다. 따라서 병용투여를 하는 동안 혈청 리튬 농도의 모니터링이 권장된다. 만약 타이저드게 이노제가 추가 사용될 경우에는 리튬 독성의 위험이 증가할 수 있다.
- 전달체(transporters) : 사람의 간 조직을 가지고 한 in vitro 연구 결과에서 발사르탄이 간 흡수 전달체 OATP1B와 간 유출 전달체 MRP2의 기질임을 보여 주었다. 흡수 전달체 자체(제레파릭산, 사이 클로포피드) 또는 유출 전달체 억제제(리토나비라와)의 병용투여는 발사르탄의 전신 노출을 증가시킬 수 있다.
- 안지오텐신 수용체 길항제, ACE억제제 또는 알리스키렌의 병용투여에 의한 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단은 이러한 약물의 단독요법과 비교시 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능의 반해(급성 심부전 포함) 위험을 증가시키는 것과 관련이 있다. 이 약과 RAAS에 작용하는 다른 약물을 병용투여하는 환자의 경우, 혈압, 신기능 및 전해질을 면밀히 모니터링해야 한다. 당뇨병이나 중증도~중증의 신장애 환자(사구체여과율 (80mL/min/1.73m²)에게 이 약과 알리스키렌 함유약제를 병용투여하지 않는다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 안지오텐신 II 수용체 길항제의 적용기간 때문에 태아에 대한 위험을 무시할 수 없다. 임신 2~3기 사이에 ACE억제제(레닌-안지오텐신-알도스테론계에 작용하는 특정 약물군)에 노출된 임부에서 태아 및 신생아에 저혈압, 고칼륨혈증, 신생아 두개골 발육부진, 요관소 그리고/혹은 무뇌증, 가역적 또는 비가역적인 심부전, 저체중 성장 지체 및 사망을 포함하여 태아 및 신생아 손상과 연관성이 있었다. 태아 신기능 감소 때면은 것으로 추측된 양수과소증으로 보고 되었고 양수과소증은 태아 사지구소증, 두개안면 기형 및 폐발육 부진과 연관성이 있었다. 총합적 위험에 의하, 임신 1기에 ACE억제제를 사용하는 것은 총합적 위험과 연관 있었다. 또한 이 약에 의한 것인지는 명확하지 않지만 미숙, 저체중 발육지연, 동맥관 열림증이 나타났다는 보고가 있다. 임부가 무위험으로 빌스리탄을 복용했을 때, 저전류산, 양수과소증, 신생아 신기능이상성이 나타났다는 보고가 있다.
 - 다른 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 직접 작용하는 약물처럼 이 약은 임신 중 또는 임신을 계획하고 있는 여성에게 사용해서는 안 되며, 투약 중 임신이 확인되면 즉시 투약을 중단한다. 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 작용하는 약물을 임신할 가능성이 있는 여성에게 처방하는 경우, 의사는 임신 중 이 약의 잠재적 위험에 대하여 알려 주어야 한다. 만약 임신 2기 이후로 임부가 안지오텐신 II 수용체 길항제에 노출되었을 경우, 태아의 신장기능과 두개골 조음과 검사가 권장된다. 또한, 저궁 내에서 이 약에 노출된 경험에 있는 신생아의 경우 충분한 배뇨, 고칼륨혈증, 혈압을 면밀히 조사해야 한다.
- 이 약이 매우 중에 분비되는 지의 일부는 배하지지 않았으나 컷트에 대한 실험에서 유출 중에 이 약의 분비가 확인되었으므로 수유부가 이 약을 사용하는 것은 바람직하지 않다. 수유중인 여성에게 이 약의 투여를 피하고, 부득이 투여하는 경우에는 수유를 중단해야 한다.
- 이 약이 사람의 생식능에 대한 영향에 대한 정보는 없다. 컷트에 대한 시험에서 발사르탄의 생식능에 대한 영향은 나타나지 않았다.

- 소아에 대한 투여

18세 미만 소아 및 청소년에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않다.
- 고령자에 대한 투여

고령자인 경우에는 일반적으로 과도한 혈압강하는 뇌경색 등이 일어날 우려가 있어 바람직하지 않다고 보기 때문에, 저용량으로부터 투여를 시작하는 등, 환자 상태를 관찰하면서 신중하게 투여해야 한다. 고령자에 대한 약물동태 시험에서 이 약의 혈중농도가 비고령자에 비해 높은 것으로 나타났다.
- 과량투여시의 처치

이 약의 과량투여에 대한 경험은 없으나 현저한 저혈압, 의식저하, 순환하탈 및 쇼크, 빈맥, 부교감 신경 자극에 의한 사색이 예측된다. 복용후처라면 구토를 유도하거나 약용탄을 투여하고 그 외에는 생리식염수 주사액을 정맥 내에 주입한다. 만일 저혈압이 발생하면 바로 누운 자세를 취하게 하고 혈액량 교정을 해야 한다. 혈액투석은 도움이 되지 않는다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 아민이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
- 기타

다수 종의 동물을 이용한 전임상 안전성 실험에서 생식독성을 제외하고는 전신 독성 혹은 특정 장기에 대한 독성은 관찰되지 않았다. 임신기간의 마지막 3개월 및 수유기에 600 mg/kg/day를 투여한 컷트의 자손에서 생존율 감소와 신체발달의 약간 지연됨이 관찰되었다. 전임상 안전성 결과는 주로 약물의 리리학적 성질에 부합하였으며 임상적인 유의성은 없었다. 빈이생선, 암색제이상유발성, 발암성은 나타나지 않았다.

[저장방법] 기밀용기, 열과 습기를 피해 30℃ 이하에서 저장

[포장단위] 발사원정40밀리그램 : 30정/병

발사원정80밀리그램, 발사원정160밀리그램 : 30정/병, 100정/병

 제조사 에이치케이이노엔주식회사 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239 고객상담센터:080-700-8802 http://www.inno-n.com	 FD-110907 LD-200327
---	---

- 본 약물은 엄격한 품질관리를 꾀한 제품입니다. 만약, 유통과정 중 잘못으로 인하여 사용기한이 경과되었거나 변질변태, 오염되었거나 손상된 약품들은 약국개설자 및 약품판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.
- 이 첨부문서 작성일자(2020년 03월 27일)이후 변경된 내용은 www.inno-n.com 또는 식품의약품안전처 약품품질정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr) ㉠ 약품정보 정보에서 확인할 수 있습니다.
- 부작용에 대해 주지: 신장은 한의학약품안전관리원(https://www.drugsale.or.kr) ㉠ 약물관리 부작용 피해구제, 대표전화: 1644-6223에 할 수 있습니다.
- 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(https://www.drugsale.or.kr) ㉠ 약물관리 이상사례 보고에 알리도록 하십시오.
- 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 보관하세요. ㉠ 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마세요. ㉠ 사용기한이 지난 약품들은 사용하지 마세요.