

비스테로이드성 소염진통제

인도메타

캡슐

(인도메타신)

한국 피임지약

Ponex Management Group

전문의약품 분류번호 : 114

인도메타캡슐은 cyclooxygenase를 비특이적으로 매우 강력하게 억제하여 prostaglandin의 합성을 차단하는 해열·진통·소염 효과의 indoleacetic acid계 NSAID입니다.

Ref: Expert Opin. Pharmacother.(2004) 5(6) : 1347-1357

【성분·함량】 1캡슐 중
인도메타신(KP)25mg
첨가제(타르색소) : 적색3호, 황색203호, 청색1호

【성상】 흰색의 가루가 들어있는 상부 암청색 하부 황색의 경질 캡슐제

【효능·효과】

1. 주 효능·효과
류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 급성 통풍성 관절염
2. 다음 질환에도 사용할 수 있다.
강직성 척추염, 수술 후·외상 후 통증

【용법·용량】

1. 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염, 수술 후·외상 후 통증 :
성인 인도메타신으로서 1회 25mg, 1일 2~3회 음식물과 함께 경구 투여한다.
1일 최고 200mg까지 투여할 수 있다.
2. 급성 통풍성 관절염 : 1회 50mg, 1일 3회 음식물과 함께 경구 투여한다.
증세가 호전되면 빨리 감량한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 1)매일 세 잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.
- 2)심혈관계 위험 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 중대한 심혈관계 혈전반응, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 투여 기간에 따라 이러한 위험이 증가될 수 있다. 심혈관계 질환 또는 심혈관계 질환의 위험인자가 있는 환자에서는 더 위험할 수도 있다. 의사와 환자는 이러한 심혈관계 증상의 발현에 대하여 신중히 모니터링 하여야 하며, 이는 심혈관계 질환의 병력이 없는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 환자는 중대한 심혈관계 독성의 징후 및/또는 증상 및 이러한 증상이 발현되는 경우 취할 조치에 대하여 사전에 알고 있어야 한다.
- 3)위장관계 위험 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 위 또는 장관의 출혈, 궤양 및 천공을 포함한 중대한 위장관계 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이러한 이상반응은 투여 기간 동안에 경도 증상 없이 발생할 수 있다. 고령자는 중대한 위장관계 이상반응의 위험이 더 클 수 있다. 투여 기간이 길어질수록 중대한 위장관계 이상반응의 발생 가능성이 증가될 수 있으나 단기 투여시 이러한 위험이 완전히 배제되는 것은 아니다. 이 약을 투여하는 동안 위장관계 궤양 또는 출혈의 증상 및 징후에 대하여 신중히 모니터링 하여야 하며, 중증의 위장관계 이상반응이 의심되는 경우 즉시 추가적인 평가 및 치료를 실시하여야 한다. 비스테로이드성 소염진통제를 중증의 위장관계 이상반응이 완전히 배제될

때까지 투여 중단하는 것도 치료법이 될 수 있다. 고위험군의 환자에게는 비스테로이드성 소염진통제와 관련 없는 다른 대체 치료제를 고려하여야 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 소화성 궤양 환자
- 2) 심한 혈액 이상 환자
- 3) 심한 간장애 환자
- 4) 심한 신장애 환자
- 5) 심한 신기능 부전 환자
- 6) 심한 고혈압 환자
- 7) 심한 체중증 환자
- 8) 이 약의 성분 또는 살리실산 제제(아스피린) 등에 과민증이 있는 환자
- 9) 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제(COX-2 저해제 포함)에 대하여 천식, 두드러기, 알레르기반응 또는 그 병력이 있는 환자(이러한 환자에서 비스테로이드성 소염진통제 투여 후 치명적인 중증의 아나필락시양 반응이 드물게 보고되었다.)
- 10) 관상동맥 우회로술(CABG) 전후에 발생하는 통증의 치료
- 11) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 12) 디클로푸니시, 트리아테렌을 투여 중인 환자(상호작용 항 참조)
- 13) 이 약을 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 소화성 궤양의 병력이 있는 환자
- 2) 혈액 이상 또는 그 병력이 있는 환자
- 3) 간장애 또는 그 병력이 있는 환자
- 4) 신장애 또는 그 병력이 있는 환자
- 5) 신기능 부전 환자
- 6) 고혈압 환자
- 7) 체중증 환자
- 8) 과민증의 병력이 있는 환자
- 9) 간질 파킨슨 증후군 등의 중추신경계 질환 환자(이러한 증상을 악화시킬 우려가 있다.)
- 10) 간질 발작성 환자
- 11) 전신성 홍반성 낭창(SLE) 환자
- 12) 궤양성 대장염 환자
- 13) 크론병 환자
- 14) 고령자

4. 이상반응

- 1) 소화기계 : 드물게 소화성 궤양, S/S 결장 병변 부위의 천공, 위장출혈, 궤양성 대장염이나 국한성 회장염 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다. 또한 때때로 복통, 식욕부진, 복부팽만감, 소화불량, 구갈, 구역, 구토, 위염, 설사, 연변, 변비, 드물게 체중증, 구내염 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 2) 혈액 : 드물게 재생불량성 빈혈, 용혈성 빈혈, 괴혈구 감소, 백혈구 감소, 혈소판 감소, 무괴혈구증, 빈혈, 정성출혈, 반상출혈, 골수장애 또는 자반, 혈소판기능 저하(출혈시간 연장) 등의 혈액장애가 나타날 수 있으므로 혈액검사를 실시하는 등 관찰을 충분히 하고 이상이 있을 경우에는 즉시 투여를 중지한다.
- 3) 피부 : 드물게 스티븐스-존슨 증후군(피부적막인 증후군), 리엘 증후군(중독성 표피괴사증), 탈모, 정성성 흉반 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 4) 속 : 드물게 속 증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 냉한 인연장병, 호흡곤란, 혈압 저하 등의 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다.

- 5) 과민증 : 드물게 천식발작 등의 급성 호흡장애, 발진, 가려움증, 두드러기, 혈관신경성 부종, 맥관염 등의 과민증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 6) 감각기계 : 만성 류마티양 관절염 환자 등에 장기 투여시 드물게 각막혼탁 또는 망막장애가 나타날 수 있으므로 정규증상(시야 혼탁 등의 시야 이상이 나타날 경우에는 즉시 투여를 중지한다. 또한 드물게 결막염, 복시, 안와 또는 그 주위의 동통, 난청, 이명 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 7) 신장 : 드물게 급성 신부전, 네프로그제 증후군, 신장염, 간질성 신염을 일으킬 수 있으므로 결뇨, 혈뇨 등의 증상 및 요단백, BUN, 혈중크레아티닌 상승, 고칼륨혈증, 저알부민혈증 등의 검사 소견이 있을 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다.
- 8) 간장 : 드물게 간염, 황달, AST, ALT의 상승 등의 간기능 이상이 나타날 수 있다.
- 9) 정신신경계 : 때때로 두통, 졸음, 현기, 휘청거림, 무력감, 피로, 신경과민, 자각 이상, 드물게 경련, 격앙, 우울, 불면, 혼수, 정신착란, 이인증, 진전, 실신, 말초신경염의 증상이 나타날 수 있다. 증상이 심하거나 감량하여도 소실되지 않는 경우에는 투여를 중지한다.
- 10) 순환기계 : 드물게 심계항진, 혈압상승, 빈맥 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 11) 기타 : 때때로 부종, 불쾌감, 가슴쓰림, 드물게 인연충조, 발한항진, 빈뇨, 당뇨, 고혈당, 비출혈 및 기타 비출혈이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

- 1) 이 약을 투여하기 전에 이 약 및 다른 대체 치료법의 잠재적인 위험성과 유익성을 고려해야 한다. 이 약은 각 환자의 치료 목적과 일치하도록 가능한 최단 기간 동안 최소 유효용량으로 투여한다.
- 2) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법에 유의한다.
- 3) 만성 질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 - ① 이 약을 장기간 투여하는 환자는 정기적으로 임상검사(노검사, 전혈구 검사(CBC) 및 이화학적 검사 등 혈액 검사, 간기능 검사 등을 실시하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 한다. 간질환 또는 신질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후에 : 호산구 증가증, 발진이 발현되거나 비정상적인 간기능 검사 또는 신기능 검사 결과가 지속되거나 악화되면 이 약의 투여를 중단해야 한다.
 - ② 약물요법 이외의 치료법도 고려한다.
- 4) 급성 질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 - ① 급성 염증, 통증 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다.
 - ② 원칙적으로 동일한 약물의 장기 투여는 피한다.
 - ③ 원인요법이 있으면 그것을 실시한다.
- 5) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 이상반응의 발현에 유의한다. 과도한 체온하강, 허탈, 사자장각 등의 증상이 나타날 수 있으므로 특히 고령을 수반한 의미, 소아 및 고령자 또는 소모성 질환 환자에는 투여 후 환자의 상태에 충분히 주의한다.
- 6) 이 약의 약리학적 특성상 염증의 다른 증상과 징후를 불현성화하여 통증 및 비감염성 조건 하에서 감염성 합병증의 진단을 지연시킬 수 있다. 이 약을 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여한다.
- 7) 위장관계 이상반응 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 궤양성 질환 또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자에게 처방시 극심한 주의를 기울여야 한다. 소화성 궤양 질환 및/또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자의 경우 이러한 위험인자가 있는 환자에 비해 비스테로이드성 소염진통제 투여시 위장관 출혈의 발생 위험이 10배 이상 증가하였다. 위장관계 출혈을 증가시키는 다른 위험인자로는 경구용 코르티코스테로이드 또는 항응고제 병용, 비스테로이드성 소염진통제의 장기 사용, 알을 섭취, 고령, 하위인 건강상태 등이 있다. 치명적인 위장관계 이상반응에 대한 자발적 보고의 대부분은 고령자 및 허약자에 대한 것이므로 이러한 환자에게는 이 약을 투여시 특별한 주의하여야 한다.
- 8) 고혈압 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압을 일으키거나, 기존의 고혈압을 악화시킬 수 있으며, 이로 인해 심혈관계 유해사건의 발생률이 증가될 수도 있다. 치아짓게 이뇨제 또는 루프형 이뇨제를 복용 중인 환자가 비스테로이드성 소염진통제 복용시 이들 요법에 대한 반응이 감소될 수 있다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압 환자에서 신중히 투여해야 한다. 이 약의 투여 초기와 투여 기간 동안에 혈압을 면밀히 모니터링 해야 한다.
- 9) 율혈성심부전 및 부종 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 복용하는 일부 환자에서

체액 저류 및 부종이 관찰되었다. 이 약은 체액 저류 또는 심부전이 있는 환자에서 신중히 투여해야 한다.

10) 비스테로이드성 소염진통제를 장기간 복용시 신장우두과사나 기타 신장 손상이 일어날 수 있다. 또한, 신장류를 유지하는데 프로스타글란딘의 역할이 중요하므로, 심부전 환자, 신기능 부전 환자, 장기부전 환자, 이뇨제나 ACE 저해제를 투여 중인 환자, 고령자 등에서는 특별한 주의가 필요하다. 투약을 중단하면 대부분 치료 전 상태로 회복된다.

11) 진행된 신질환: 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제적 임상 시험은 실시된 바 없다. 따라서, 진행된 신질환 환자에 대해서는 이 약의 투여가 권장되지 않는다. 이 약의 투여를 가시해야 한다. 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 한다.

12) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 간기능 수치, 간의 상승이 나타날 수 있다. 이러한 비정상적인 검사수치는 치료가 지속됨에 따라 악화되거나 변화가 없거나 또는 일시적일 수 있다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여로, 황달, 치명적 전격성 간염, 간사사, 간부전(일부는 치명적임)을 포함한 중증의 간 관련 이상반응이 드물게 보고되었다. 간기능 이상을 암시하는 증상 및/또는 징후가 있는 환자 또는 간기능 시험 결과 비정상인 환자에서 일어사는 투여 기간 동안 주의 깊게 간기능의 악화 여부를 관찰하고, 간질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후에: 호산구 증가증, 발진이 발현되는 경우에는 이 약의 투여를 중지한다.

13) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 빈혈이 나타날 수 있으므로 이 약의 장기 투여에 의해 빈혈의 증상 또는 징후가 나타나는 경우에는 헤모글로빈치 또는 헤마토크리트치 검사를 해야 한다. 비스테로이드성 소염진통제는 혈소판 응집을 억제하며, 일부 환자에서는 출혈시간을 연장시키는 것이 확인되었다. 아스피린과 달리 이 약의 혈소판 기능에 대한 영향은 상대적으로 작고 지속기간이 짧으며 가역적이다. 응고관련 질환이 있거나 항응고제를 투여하고 있는 경우와 같이 혈소판 기능 변경에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있는 환자는 이 약 투여시 신중히 모니터링 하여야 한다.

14) 아나필락시양 반응: 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 아나필락시양 반응은 약물에 노출된 경력이 없는 환자에서도 일어날 수 있다. 이러한 복합 증상은 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제 투여 후 비특이적 발현을 동반하거나 동반하지 않거나 또는 점진적으로 치명적인 중증의 기관지 경련을 나타내는 전신 환자에게 전형적으로 발생한다. 이러한 아나필락시양 반응이 나타나는 경우 응급처치를 실시하여야 한다.

15) 피부반응: 이 약은 탈락성 피부염, 스티븐스-존슨 증후군 및 독성 표피괴사 같은 중대한 피부 이상반응을 일으킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이들 중대한 이상반응은 경도 증상 없이 발생할 수 있다. 대부분의 경우 이러한 이상반응은 투여 초기 1개월 이내에 발생한다. 환자는 중대한 피부 발현 증상 및 징후에 대해 알고 있어야 하며 피부 발진 또는 다른 과민반응의 최초 증상 및 징후가 나타날 때 약물 투여를 중단해야 한다.

16) 전신 환자 중 일부는 아스피린에 민감하게 반응할 수 있다. 아스피린 민감성 전신 환자에게 아스피린을 사용하는 경우 치명적일 수 있는 중증의 기관지경련과 관련될 수 있다. 이러한 아스피린 민감성 환자에서 아스피린과 다른 비스테로이드성 소염진통제 간의 기관지경련을 포함하는 교차반응이 보고되었다. 그러므로 이 약은 이러한 아스피린 민감성 환자에게는 투여하지 않도록 하며, 전신 환자에게는 주의 깊게 사용해야 한다.

17) 이 약은 코르티코이드 체제를 대체하거나 코르티코이드 결핍증을 치료하기 위한 약물로 사용될 수 없다. 코르티코스테로이드의 갑작스러운 투여 중단은 코르티코스테로이드-반응성 질환의 악화를 초래할 수 있다. 장기간 코르티코스테로이드를 복용해 온 환자에게 이 약을 투여하고자 할 경우에는 서서히 용량을 감소시켜야 한다.

18) 졸음, 어지러움, 주의력, 집중력, 반사운동 능력의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약 투여 중에 환자가 자동차 운전 등 위험이 따르는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

6. 상호작용

- 1) 디클로푸나살과 병용 투여시 심한 위장출혈이 발생했다는 보고가 있으므로 병용 투여하지 않는다.
- 2) 프로베나시드와 병용 투여시 이 약의 작용이 증가될 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다
- 3) 트리암테렌과 병용 투여시 상호 이상반응이 증가될 수 있으므로 병용 투여하지 않는다. (질소산화물, 크레아티닌 청소율의 저하가 생길 수 있다)
- 4) 비아클로프로판과 병용 투여시 그 독성을 증가시키므로 병용 투여하지 않는다.

5) 이 약은 사이클로옥시게나제-2(cyclooxygenase-2) 선택적 저해제를 포함하여 다른 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)와 병용 투여할 경우 이상반응의 위험이 증가할 수 있으므로 병용 투여하지 않는다.

6) β -차단제, 칼토프릴, 에날라프릴, 치아지제 이노강압제, 푸로세미드와 병용 투여시 그 작용을 저하시킬 수 있으므로 신중히 투여한다.

7) ACE 저해제: 비스테로이드성 소염진통제에 의해 ACE 저해제의 항고혈압 효과가 감소될 수 있다는 보고가 있으므로 이 약과 ACE 저해제를 병용 투여하는 경우 이러한 상호작용을 염두에 두어야 한다.

8) 푸로세미드: 임상시험 및 시험 후 조사 결과 이 약의 신장작용의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 일부 환자에서 푸로세미드 및 치아지제 이노제의 나트륨 배설 효과가 감소할 수 있음이 확인되었다. 이들 약물과 비스테로이드성 소염진통제를 병용 투여하는 동안 신부전 징후를 면밀히 관찰해야 한다.

9) 아스피린: 아스피린과의 병용이 비스테로이드성 소염진통제의 사용과 관련된 중대한 심혈관계 혈전증의 위험을 감소시킬 수 있다는 일반적인 증거는 없다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 이 약과 아스피린의 병용에 의해 중증의 위장장애 이상반응의 발생 위험이 증가될 수 있으므로 두 약물의 병용은 일반적으로 권장되지 않는다. 또한 아스피린과 병용 투여시 이 약의 작용이 저하될 수 있다.

10) 리튬: 비스테로이드성 소염진통제는 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 혈청 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신클리어런스를 감소시킬 수 있다. 따라서 비스테로이드성 소염진통제와 리튬의 병용 투여시 리튬의 독성 징후를 주의 깊게 관찰해야 한다.

11) 쿠마린계 항응고제(와파린 등): 위장관계 출혈에 대하여 와파린과 비스테로이드성 소염진통제는 상승작용을 나타낼 수 있으므로 두 약물을 함께 사용하는 환자는 단독으로 투여하는 경우에 비해 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있다. 쿠마린계 항응고제와 병용 투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.

12) 메토크세이트: 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)와의 병용 투여로 신세뇨관에서 메토크세이트의 배설이 지연되어 치명적인 메토크세이트의 혈액학적 독성이 증가될 수 있으므로 항암요법으로 사용하는 고용량(15mg/주 이상)의 메토크세이트와는 병용 투여하지 않으며, 저용량의 메토크세이트와 병용 투여시 신중히 투여하여야 한다.

7. 임부에 대한 투여

- 1) 동물실험(마우스)에서 기형발생이 보고되어 있으므로 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 이 약을 투여해서는 안 된다.
- 2) 임신 말기에 투여시 태아순환지속증(PFC), 태아의 동맥관 수축, 동맥관 개존증, 양수과다증, 태아 신부전, 태아 장전공, 양수과소증이 발생했다는 보고가 있다.
- 3) 임신말기에 투여한 경우 초기 출산한 신생아에서 과사성 장염의 발생률이 높다는 보고가 있다.
- 4) 태아에 대한 실험에서 비스테로이드성 소염진통제는 프로스타글란딘 합성을 저해하는 다른 약물과 마찬가지로 난산의 발생 빈도를 증가시키고, 분만을 지연시키며 새끼의 생존율을 감소시켰다.

8. 수유부에 대한 투여

이 약은 모유의 이행이 보고되어 있으며, 이로 인해 영아에서 심각한 이상반응의 발생이 우려되므로, 수유부에 대한 약물 투여의 중요성을 고려하여 수유를 중단하거나 약물 투여를 중단해야 한다.

9. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다. 또한 소아에게 대량을 경구 투여했을 때 심한 이상반응(감염증의 불형성화, 간염)이 나타났다는 보고가 있으므로, 다른 약이 유효하거나 사용할 수 없는 만성 류마티스 관절염에만 투여를 고려하며, 투여하는 경우에도 최소용량을 사용하는 등 신중히 투여한다.

10. 고령자에 대한 투여

고령자에서는 이상반응이 나타나기 쉬우므로, 소량부터 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다. (일반적 주의 5번 항 참조)

11. 적응상의 주의

위장장애의 발현을 없애기 위해 식사 직후에 투여하거나 음식, 우유, 제산제 등과 함께 투여하는 것이 바람직하다.

12. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

13. 기타

동물실험(마우스)에서 렌타난과의 병용에 의해 소화관 궤양, 소화관 천공이 나타났다는 보고가 있다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30캡슐, 100캡슐

KGMP 적격업소 제품

[제조자] (주)한국피엠지제약 / 경기 시흥시 정왕동 사회공단 1라 603호

※이 첨부서 작성일자(2011. 08. 01) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전청 약품품 전지원원창구 (<http://ezdrug.kda.go.kr/>)의 '의약품 정보' 란을 통하여 확인하실 수 있습니다.
※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 병·외관, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드립니다. 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다.
※의약품은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하시기 바랍니다.
※유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

 **한국피엠지제약**
Pionex Management Group

PMG PHARM
Pionex Management Group