


마그네슘, 비타민D 함유 칼슘제 본에킹

연질캡슐



【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(1,830mg) 중

인산수소칼슘수화물(KP)	590.00mg
(칼슘으로서 137.41mg, 인으로서 106.19mg)	
글루콘산칼슘수화물(KP)	170.00mg
(칼슘으로서 15.20mg)	
능축클레칼시페롤(유상형)(BP)	0.50mg
(비타민 D로서 500IU)	
산화마그네슘(KP)	10.00mg
(마그네슘으로서 6.03mg)	
첨가제(식약청인정타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호	

【성상】 유백색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 정방형 연질캡슐

【효능·효과】

- 다음의 경우에 비타민D의 보급
 - 임신·수유기
 - 발육기
 - 노년기
- 이 약에 포함된 비타민의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 뼈·이의 발육불량
 - 구루병의 예방

【용법·용량】 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 과칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3) 만 1세 미만의 영아(갓난아기)
 - 4) 신결석 환자
 - 5) 중증(심한 증상)의 신부전환자
 - 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.
 - 3) 임부, 수유부
 - 4) 심장, 순환기계기능 장애 환자

5) 신장애(신장장애) 환자

6) 저단백혈증 환자

7) 감심배당체를 투여 중인 환자

8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 헤징(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

9) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. : 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 구역질, 피부발진, 홍반(붉은 반점), 설사, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하

2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.

2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 상호작용

1) 항알도스테론제, 트리암테네과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 한다.

2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 않는다.

가) 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제

3) 녹차, 홍차 등 난민을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

3) 오용(잘못 사용), 남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) / 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

【포장단위】 60연질캡슐, 120연질캡슐

【소비자상담실】 02)568-0051

【반품 및 교환처】 02)832-5913

【제조사】 **RP Corp** (주)알피 제약회사등록번호 432943-7

【판매처】 **대웅제약** 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 설명서 작성일자(2012년 7월)이후 변경된 내용은 이이드릭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인할 수 있습니다.