

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

일반의약품

치질치료제

분류번호 : 256

렉센-에스좌제

REXEN-S Supp.

치질(痔疾)은 치핵, 치루, 치열 등 항문과 그 주위에 생기는 모든 병을 일컫는 말로서, 치정맥총(Hemorrhoidal plexus)의 정맥압이 지속적으로 증가 시 항문주위의 정맥총이 정맥류처럼 확장되어 정맥울혈을 일으켜 발병합니다. 이러한 치질은 장기간 앉아 있거나 걸어도니는 근무환경에 있는 직장인, 임신부 혹은 변비로 인한 대변배출시 심한 긴장감을 보이는 분에게 많이 발생합니다.

렉센-에스좌제는 치질증상의 개선에 효과적인 프라목신염산염(국소마취/진통) 및 황산아연수화물(수렴제)을 함유한 치질치료제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1좌제 중

프라목신염산염(USP)	20mg
황산아연수화물(USP)	10mg

【성상】 흰색의 포탄형 좌제

【효능·효과】

다음에 의한 통증과 불쾌감의 증상 완화 : 내치질, 외치질, 항문염, 항문열창(항문 찢긴상처), 치루(항문삔길), 항문수술

【용법·용량】

1회 1개씩, 1일 2회 아침, 저녁 항문내에 삽입한다

· 좌약이 무르게 된 경우에는 잠시 냉각시킨 후에 사용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음의 환자에는 사용하지 말 것

- 1) 항부(질항부위)가 화농(끓음)되어 있는 환자
- 2) 이 약에 민감한 환자

2. 다음 환자는 사용전에 의사 또는 약사와 상담할 것

- 1) 지금까지 약에 의해 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 일이 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 3) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 4) 항문 출혈이 있는 사람

3. 부작용

- 1) 이 약의 사용에 의하여 발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기), 자극감 또는 화농(끓음) 등의 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것
- 2) 10일정도 사용하여도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것

4. 일반적주의

- 1) 정해진 용법용량을 지킬 것
- 2) 이 약이 무르게 된 경우에는 잠시 냉각시킨후에 사용하며 또한 지나치게 경화된 경우에는 무르게 한 후 사용할 것
- 3) 이 약은 항문에만 사용하고 내복하지 말 것

5. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 좌제는 체온으로 녹기 쉽도록 제조되어 있기 때문에 직사광선이나 온도가 높은 곳을 피하여 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말것

【저장방법】

기밀용기, 22℃ 이하 냉소보관

좌제는 체온으로 녹기 쉽도록 제조되어 있기 때문에 직사광선이나 온도가 높은 곳을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오.

【포장단위】 10개입

【소비자 상담 창구】

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 홈페이지 1:1 상담을 이용해주시요.

TEL : (02) 3489-6114

홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2013. 03. 12)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '11. 06. 15

설명서 개정년월일 : '13. 03. 12

제품의 사용기한은 외부용기에 표기
P32460-03

제조의뢰·판매원



한림제약 주식회사

공장:경기도 용인시 처인구 영문로 2 27

<http://www.hanlim.com>

제조원

생명과학 벤처기업-



(주)씨트리 제약사업부

본사 및 공장:경기도 남양주시 경강로 27