

안전한 변비치료제 **액티큐정**

【원료약품의 분량】1정 중

비사코딜(KP)	3.0mg
도큐세이트나트륨(EP)	16.75mg
청가제(타르색소)	황색 203호, 황색 4호, 청색 1호

【성상】광택이 있는 원형의 녹색 장용성 당의정

【효능·효과】

1. 변비
2. 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부(배부분)팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】

1. 15세 이상 : 1회 1~2정, 1일 3회 식후에 복용
 2. 11세 이상 ~ 15세 미만 : 1회 2/3~4/3정, 1일 3회 식후에 복용
 3. 7세 이상 ~ 11세 미만 : 1회 1/2~1정, 1일 3회 식후에 복용
- 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.

- 1) 급성 복부(배부분)질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
- 2) 장폐색(창자막힘) 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 심한 복통(배아픔) 또는 구역, 구토 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 3) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 4) 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

3. 이상반응

이 약을 투여함으로써 심한 복통(배아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의하십시오.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여합니다.
- 3) 반드시 필요한 경우 이외에는 10세 이하의 소아에는 투여를 피하는 것이 바람직합니다.
- 4) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의하십시오.

5. 소아에 대한 투여

이 약은 7세 미만의 영·유아(갓난아기, 유아)에게 투여하지 마십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면(습기가 적은) 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】자사 포장단위

※ 주의

1. 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
2. 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오소된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부서 작성일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 <http://www.dreampharma.co.kr>나 수신자부담문의전화 080-729-5800 에서 확인할 수 있습니다.

※ 설명서 작성년월일 : 2011. 09. 16.



드림파마

경기도 화성시 함남읍 성인의 302-3