

Neosol® 특허공법으로 효과빠른

기침감기약 메가클린 연질캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(660mg)중

구아이페네신 (KP).....	50.0 mg
dl-메틸에페드린염산염 (KP).....	12.5 mg
덱스트로메토르판브로화수소산염수화물 (KP).....	10.0 mg
클로르페니라민말레산염 (KP).....	2.0 mg

첨가제 (타르색소) : 적색 40호 청색 1호

[성상] 무색 또는 옅은 적색의 투명한 내용물을 함유한 적색의 투명한 다원형 연질캡슐

[효능·효과] 기침, 가래

[용법·용량] 만 15세 이상 1일 3회, 1회 2캡슐

[사용상 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것
다른 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약 (비염(코염)용 경구제, 말미약, 알레르기용액), 진정제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것
 - 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(갓난아기), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(갓난아기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의깊게 모니터링해야 한다.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
 - 간질질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 다음과 같은 기침이 있는 사람
출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타나면 경우
발진·발적(종혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨(소변을 누)곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면
 - 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 만 7세 이하의 영아(갓난아기), 유아에게는 시럽제를 복용시킬 것
 - 복용시에는 음식하지 말 것.
 - 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
"어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오."

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 자사포장단위

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.
- 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2011년 09월)이후 변경된 내용은 이지드렉(<http://ezdrug.kda.go.kr/kda2>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자 상담(선별품 및 교환제) : 080-022-5805 (무로전화서비스)

제조사

알앤피코리아(주)
한대중제약의 계열사

제조의뢰·판매자

명문제약(주)
경기도 화성시 향남읍 상신리 901-1
www.mmp pharm.co.kr

〈설명서 작성년월 : 11.09〉
〈M01〉