



일반의약품
분류번호 329



[원료약품 및 그 분량] 1병(20mL) 중

자하거엑스(Human Placenta Extract)(별규).....	1.5mL
티아민질산염(Thiamine nitrate)(K.P).....	5.0mg
리보플라빈포스페이트나트륨(Riboflavin sodium phosphate)(K.P).....	6.85mg
피리독신염산염(Pyridoxine hydrochloride)(K.P).....	5.0mg
니코틴산아미드(Nicotinic acid amide)(K.P).....	20.0mg
카페인무수물(Caffeine anhydrous)(K.P).....	30.0mg
[보존제]벤조산나트륨(Sodium benzoate)(K.P).....	12.0mg

[성상] 갈색 유리용기에 담긴 황색의 투명한 액체

[효능·효과] 자양강장, 허약체질, 육체피로, 병후의 체력저하, 식욕부진, 영양장애, 발열성·소모성 질환

[용법·용량] 성인 1일 1회, 1회 1병 복용

[사용상의 주의사항]

- 경고 - 이 약은 유효성분으로서 사람 태반 유래 성분을 함유하고 있으며, 원재료인 사람 태반을 제공하기로 동의한 임신부에 대하여 문진과 여타 감염증의 미감염 사실을 확인하고, 제조공정 중 바이러스 불활성화 과정 등을 통하여 감염증의 전파를 방지토록 하고 있으나, 사람 태반을 원재료로 사용하여 제조한 것이므로 그 유익성이 위험성을 상회하는 경우에만 복용할 것
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응이 있는 환자
 - 2) 레보도파 성분의 약을 복용하는 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부, 수유부
- 이 약의 복용으로 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 구역, 구토, 묽은 변, 인두염이 나타나는 경우
 - 2) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(요산 과다증)(hyperuricemia: 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으키는 경우
 - 3) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하여(이 약 1병(20mL) 중 피리독신염산염 5mg 함유) 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타나는 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 일정기간 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 3) 이 약은 경구용으로만 사용하고 주사용으로 사용하지 않는다.
 - 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관할 것
 - 3) 오·남용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 20mL x 30병, 60병

[제조자] (주)제이알피 - 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 34-40


[제조의뢰자] (주)테라젠이텍스 - 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58

[판매자] 한국마이팜제약(주) - 서울특별시 강남구 언주로69길 5, 503

※ 참조

1 손으로 열때

양 손으로 병을 감싼 뒤,
두 엄지 손가락에 힘을
주어 90° 방향으로
뒤로 밀어줍니다.



2 오프너를 사용할 때

오프너를 뚜껑(금색부분)에
씩은 후, 45° 방향
오른쪽으로
꺾어줍니다.



※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서(설명서)를 주의깊게 읽어야 하며, 이 첨부문서(설명서)를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원 회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(의약품유해 사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexpfarm.com에서 확인할 수 있습니다.