

징코탑정

(은행엽건조엑스)

■ 성분 · 함량 : 1정 중

- 유효성분 : 은행엽건조엑스(생규) 120mg(총 징코플라본배당체로서 28.8mg)
- 첨가제(타르색소) : 청색1호(브릴리안트블루FCF)알루미늄레이크, 황색203호(퀴놀린옐로우WS)알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소의 우유)
- 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 콜로이드성산화규소, 크로스카멜로스나트륨, 탈크, 프로필렌글리콜, 히프 로멜로오스

■ 성상 : 녹색의 원형 필름코팅정

■ 효능 · 효과

1. 말초동맥순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
2. 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
3. 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애

■ 용법 · 용량

1. 성인
 - ① 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽건조엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여(복용)하십시오.
 - ② 기질성 뇌기능장애 : 은행엽건조엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구투여(복용)하십시오.
2. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않습니다.)
 - 3) 임부(동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적습니다.)
 - 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예 : 펜프로쿰, 와파린), 항혈소판제(예 : 클로피도그렐, 아세탈살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))를 복용하고 있는 환자
 - 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 수술이 예정된 자
 - 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
 - 3) 이상반응
 - ① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.
 - ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만, 이로써 곧 해당 성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.
 - 어지러움
 - 가려움증
 - ③ 기타 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있습니다. 다만, 이로써 해당성분과 이상사례간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.
4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않습니다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아)보관하십시오.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 150정, 300정(150정X2)

■ 제조의뢰자 : (주)테라젠이텍스

경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58(초지동)

■ 제조자 : 알리코제약(주)

충청북도 진천군 광혜원면 웅소2길 21

■ 판매자 : 광동제약(주) / 경기도 평택시 산단로 114

테라젠이텍스

알리코제약(주)

- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손에 닿지않게 보관하여야합니다.
- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- ※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 공 정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품정보를 참조하세요.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(의약품 유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexpharm.co.kr에서 확인할 수 있습니다.