

쿨스트림

필름형트로키

일반의약품 | 분류번호: 231(치과구강용약)

10매

입안 염증
목이 아플 때

쿨스트림
필름형트로키



광동제약(주)

/ 인두염 / 편도염 / 구내염 / 쿨스트림 필름형트로키

/ 입안 염증 / 목이 아플 때 / 쿨스트림 필름형트로키

[원료약품 및 분량] 매 45mg중 염화세틸피리디늄(USP) 15mg, 첨가제(타르색소) 청색호 [성상] 청색의 직사각형 경구 필름제 [효능·효과] 다음 질환에 의한 염증의 완화·인두염·편도염·구내염(입안염) [지정방법] 기밀용기 실온보관(1~30℃) [용법·용량] 성인 염화세틸피리디늄으로서 1회 15mg(1매)를 1일 4~5회 씹거나 삼키지 말고 입안에서 천천히 녹여 복용한다. 연령 증상에 따라 적절히 증감한다. **[사용상의 주의사항]** 1. 경고: 본제에 함유되어 있는 인공감미료(단맛제) 아스파탐은 체내에서 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증환자에는 투여하지 말 것. 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 1) 알레르기성 접촉성 습진이 나타나기 쉬운 환자, 3) 이상 반응: 1) 과민증, 발진 등이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. 2) 정신신경계: 고열, 두통이 나타날 수 있다. 3) 소화기계: 구역이 나타날 수 있다. 4) 구강: 발진, 두드러기, 미란(지름) 드물게 구강(입안), 인두의 작열감(화끈감) 등 구강(입안)점막의 과민반응이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. 4. 소아에 대한 투여: 본제를 삼킬 위험이 있으므로 3세 이하의 영·유아에는 투여하지 않는다. 5. 저용량의 주의: 침으로 천천히 녹여 복용하며 유효성분이 장시간 입안에 머물도록 씹거나 삼키지 말고 가능한 한 오래 입안에 물고 있다. 6. 저장상의 주의사항: 1) 소아의 손이 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것. *본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. *본 제도는 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해드립니다. *본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 전성일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ekdp.com), 콜로버서비스(030-024-0030)에서 확인할 수 있습니다. *유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고 구입처에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

제조사: (주)일림 총정량도 이상시 신중히 가나길 101

판매처: 광동제약(주) 경기도 평택시 신안로 114

작성일자: 2012.04.30.



광동제약(주)

경기도 평택시 신안로 114
www.ekdp.com

