


정부공인
KGMP
적격업체

일반 의약품
분류번호:316

비바원정

ViVA one Tab.



500정

조제용

【원료약품 및 그분량】 1정 중
티아민질산염(KP)---100mg, 니코틴산아미드(KP)---20mg
피리독신염산염(KP)---2mg, 판토텐산칼슘(KP)---10mg
0.1%시아노코발라민(KPC).....2mg(시아노코발라민으로서 2 µg), 첨가제(타르색소): 적색 40호

【효능 및 효과】 다음 경우의 비타민 B₁, B₆의 보급
· 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시
· 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
· 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등)
· 각기 · 눈의 피로

【용법 및 용량】 8세 이상 어린이 및 성인: 1일 1회, 1회 1정

【성상】 분홍색의 장방형 필름코팅정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【수신자부담고객상담실】 080-988-8889

【제조사】 조아제약(주) 본사: 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7 공장: 경남 함안군 함안면 파수리 465

【사용상의 주의사항】 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 2) 만 3개월 미만의 영아 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

1) 만 1세 미만의 영아 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3. **부작용** 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다: 구역, 구토, 뱀은변 2) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 간 각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 3) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애, 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있다. 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₆를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다. 4. **일반적 주의** 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다. 3) 1개월 정도 투여하여도 증상이 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다. 5. **상호작용** 1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용 투여하지 않는다: 레보도파 6. **지장상의 주의** 사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 뭘 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다. 3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다. * 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.

제조번호:

사용기한:

