

멜아웃 정

맑고 깨끗한 피부를 위하여

Melout Tablets

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

트라넥삼산(EP)	125mg
엘리스테인(DAB)	40mg
제피아스코르브산(KPC)	51.5mg (아스코르브산으로서 50mg)
판토텐산칼슘(KP)	4mg
피라독신염산염(KP)	1mg
첨가제(타르색소): 적색 40호(AL), 청색 1호(AL), 황색 203호(AL)	

■ 성상 : 분홍색의 원형 필름코팅정

■ 효능 : 효과 : 기미

■ 용법 : 용량

15세 이상 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용하십시오. 15세 미만은 복용하지 마십시오. 용법·용량을 엄수하여 주시기 바랍니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 트라넥삼산을 함유하는 내복약을 복용하고 있는 사람
- 2) 트롬빈을 투여 중인 사람
- 3) 중증 신장애(신장장애) 및 간성혼수가 있는 사람
- 4) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 사람
- 5) 혈전증이 있는 사람(뇌혈전, 심근경색, 혈전성정맥염, 폐색전증 등)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람
- 3) 55세 이상의 사람
- 4) 본인 또는 가족이 알레르기 체질의 사람
- 5) 약에 의한 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 6) 혈전증을 일으킬 우려가 있는 사람(이전에 혈전증에 걸린 적이 있는 사람, 가족이 혈전증을 일으킨 사람, 의사와부터 선천성 응고이상증을 지적받은 적이 있는 사람, 경구피임약·호르몬보충요법 등의 혈전증을 일으킬 우려가 있는 약을 복용하고 있는 사람)
- 7) 신장애(신장장애)가 있는 사람
- 8) 시스템노증이 있는 사람
- 9) 자신의 검버섯이 본래의 효능효과인 기미인지 아닌지 식별이 어려운 경우, 또 색이 거무스름하고, 색조가 불균일하고, 표면이 튀어나온 기미의 형태는 피부과외과에게 상담하십시오.

3. 복용 후 다음의 증상이 나타난 경우는 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 1) 피부: 발진, 가려움
- 2) 소화기계: 설사, 오심(구역), 구토, 복통(배앓), 식욕부진, 가슴쓰림

4. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 본제는 혈전(혈액이 굳어진 것)을 용해하기 어렵게 하는 작용이 있으므로 혈전증의 초기증상(심한 두통·혀의 꼬임, 10분 이상 가슴을 짚는 듯한 통증·갑작스런 숨참, 한쪽 종아리의 통증·부종(부기), 원인불명의 갑작스런 호흡곤란·가슴의 통증을 동반한 일과성(한번 나타나고 없어지는)의 의식소실 등)에 주의하십시오.
- 2) 2개월 이상 계속 복용하지 마십시오.
- 3) 복용중지 후 재발하여 재복용시 최저 2개월 간격을 두어 복용하며 이때도 2개월 이상 복용하지 마십시오.
- 4) 기미 개선의 정도에는 개인차가 있으며, 효과가 있는 경우도 기미가 완전히 사라지지 않습니다.
- 5) 이 약의 복용에 의해, 뇨 및 대변의 검사치에 영향을 줄 수 있으므로 의사의 검사를 받는 경우는 비타민C를 함유하는 제제를 복용하고 있는 것을 의사에게 알려 주십시오.
- 6) 이 약의 과량 투여시 구역, 구토, 기립성 저혈압 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 구토유발, 위세척, 활성탄투여 등의 일반적 처치를 시행합니다. 신배설을 촉진시키기 위해 다량의 수액섭취를 유지합니다. 혈전형성의 위험이 있는 사람은 항응고제치료를 고려합니다.

5. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 2) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
- 4) 젖은 손으로 취급하지 마십시오.
- 5) 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 마십시오. 또 개봉 후에는 되도록 빨리 사용하십시오.

6. 기타

트라넥삼산을 개에게 장기간 대량투여 시 망막변화를 일으켰다는 보고가 있습니다.

■ 저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 180정

* 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.

* 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일(2011년 06월 01일)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr)나 소비자상담실 080-611-8690(수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.

제조발매원
주식회사 동구제약

본사: 서울특별시 강남구 테헤란로 195-2
중앙·경기·도·광역시·광역시 청문로 901-3
www.dongkoo.co.kr