

- **성분·함량** : 이 약 1캡슐 중
락토바실루스 스포로게네스균(KPC) 20mg
(생균수로서 2×10^8)
우르소데옥시콜산(KP) 10mg
첨가제(동물유래) : 유당수화물(네덜란드, 독일, 오스트리아,
체코, 슬로베니아, 슬로바키아산 2~7년 건강한 소의 우유)
- **성상** : 흰색 내지 미황색의 분말이 든 상, 하부 담황색의 경질캡슐제
- **효능·효과** : 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(위체)(체
함), 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 정장, 변비, 물
은 변, 복부팽만감, 장내이상발효
- **용법·용량** : 8세 이상 : 1회 1캡슐, 1일 3회
- **저장방법** : 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시
사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제
품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여
교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한
"소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피
해에 대해 보상해 드립니다.



腸과 더불어 즐거운~♪♪
정장생균

더블락 캡슐

Double Rack



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

일반의약품

180캡슐

● **사용상의 주의사항** 1. 다음환자에는 투여하지 마십시오. 1) 이
약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성
(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp
lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애
(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있
는 환자에게는 투여하지 마십시오. 2. 다음환자에는 신중히 투여
하십시오. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 다른 약물을 투여
받고 있는 환자 3. **일반적 주의** 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키
십시오. 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는
투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오. 4. 소아에 대
한 투여 1) 이 약은 7세 이하의 영아(갓난아기)·유아에게 투여하
지 않습니다. 2) 3개월 미만의 영아(갓난아기)에게 투여할 경우에
는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 합니다. 5. **저장상의 주의**
사항 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사일광
을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭
닫아) 보관하십시오. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위
하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다. 개정연월일 : 2011.11.03
P1109-01

제조번호 :

사용기한 :