미놀 에프트로키 모과맛

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

미놀에프트로키 모과맛

일반의약품
분류번호 : 222

【제품명】 미놀에프트로키(모과맛)

【원료약품 및 그 분량】 1 트로키 중

- 유효성분 : dl-메틸에페드린염산염(KP) ····· 12.5mg
 노스카핀(KP) ····· 10mg
 구아야콜설폰산칼륨(USP) ····· 45mg
 세틸피리디늄염화물수화물(USP) ····· 1mg
- 첨가제(타르색소) : 황색4호(타르타르진) 알루마늄레이크
- 기타 첨가제 : 레몬맛분말(14125), 레몬향코트, 모과향분말, 분당, 스테아르산마그네슘, 아세설팜칼륨, 아스파탐, 이소말트, 메타린트, 포비돈, D-만니톨, l-멘톨

【성상】 미황색의 구멍이 뚫린 원형 트로키제

【효능 · 효과】 기침, 가래, 천식, 구내염(입안염), 편도염, 인 · 후두(목구멍)염으로 인한 목쉼 · 목의 불쾌감 · 인후(목구멍)통 · 목이 부어오름

【용법 · 용량】 다음 복용량을 씹거나 삼키지 말고, 입안에서 천천히 녹여서 복용한다.
만 15세 이상 및 성인 : 1회 1정씩 1일 6회(복용간격 2시간 이상)
만 11세 이상~만 15세 미만 : 1회 1정씩 1일 4회(복용간격 3시간 이상)
만 8세 이상~만 11세 미만 : 1회 1정씩 1일 3회(복용간격 4시간 이상)

【사용상의 주의사항】

1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
5) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 진해기침을 그치게 함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염·코염용 경구제, 멀미약, 알레르기용약), 진정제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
3) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 고령(재노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
4) 수유부
5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
6) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
7) 편도선절제술, 구강(입안)수술 후 7일 이내의 사람
8) 이 약은 황색4호(타르타르진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여 한다.

5. 다음과 같은 경우, 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 어지러움, 불안, 떨림, 불면
2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
3) 만 7세 이하의 영(갓난아기) · 유아에게는 시럽제를 복용시킬 것
4) 복용시에는 음주하지 말 것

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관
【포장단위】 12트로키, 36트로키
【제 조 자】 경남제약(주)
충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길49



※ 기타 주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. PTP포장을 개봉하여 복용 시 가끔 트로키제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 트로키제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.
3. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.
소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.com

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 기타 자세한 약품 정보는 의약품통합정보시스템 「http://nedrug.mfds.go.kr」 → 「의약품 등 검색」을 참조하시기 바랍니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있다.
부작용 보고 및 피해구제 신청(1644-6223)

경남제약㈜

PP0497-K01
첨부문서 작성연월일 2020. 03. 03