

■ 성분 · 함량 : 1캡슐 중	
콘드로이틴설페이트나트륨(KP).....	300mg
푸르실티아민(KP).....	50mg
리보플라빈부티레이트(KP).....	6mg
니코틴산아미드(KP).....	10mg
판토텐산칼슘(KP).....	10mg
피리독신염산염(KP).....	10mg
시아노코발라민(KP).....	30μg
토코페롤아세테이트(KP).....	50mg
(비타민D로서 50IU)	
γ-오리자놀(KP).....	5mg

첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호

※ 콘드로이틴설페이트나트륨 : 전염성 해면상뇌증(TSE)미감염 소의 연골을 취하여 강한 알칼리처리를 하여 제조된 콘드로이틴설페이트나트륨을 사용한다.

■ 성상 : 황색의 내용물이 충전된 적색의 장방형 연질캡슐

■ 용법 · 용량 : 성인 및 8세 이상의 어린이 : 1일 2회, 1회 1캡슐을 복용

■ 효능 · 효과

1. 다음경우의 비타민(B₁, B₂, B₆)의 보급 : 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후형을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하시, 노년기
2. 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목경림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)
3. 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨경림) 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염, 각기, 눈의 피로

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 3개월 미만의 영아
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부, 수유부
- 3) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 4) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 이상반응

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
: 위부 불편감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕 부진, 복부(배부분) 팽만감
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 엽산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킵니다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여합니다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장하십시오. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 상호 작용

이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여(함께 사용) 하지 않습니다.

- 1) 레보도파

6. 임상검사치에의 영향

요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 3) 오용(잘못사용)을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

■ 저장방법 : 기밀봉기, 실온보관(1~30℃)

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 60캡슐, 120캡슐

■ 제조의뢰자 : (주)테라젠이텍스 (경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58(초지동))

■ 제조자 : (주)동구바이오제약 (경기도 화성시 향남읍 제약공단22길 18)



동화약품

SINCE 1897

서울특별시 중구 서소문로9길 14

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서(설명서)를 주의깊게 읽어야 하며, 이 첨부문서(설명서)를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

※ 구입시 사용되는 모든 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결 기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexpfarm.com 에서 확인할 수 있습니다.

개정일 : 2015. 05. 19

MF502-150519-02