

설사, 구토, 식체 등의 치료제

분류번호:237

일반의약품

K G M P

적격업체

# 폴리아린에프 캡슐

## 【성분·함량】 1캡슐 중

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| 베르베린염화물수화물(베르베린염화물로서 14.2 mg) (KP)                 | 15.57 mg |
| 비스무트차질산염(비스무트로서 73 mg) (KP)                        | 100 mg   |
| 우르소데옥시콜산(KP)                                       | 2 mg     |
| 스코폴리아엑스10배산[총알칼로이드(하오스시아민 및 스코폴라민)으로서 0.05mg] (KP) | 50 mg    |
| 유당수화물(기원 : 소, 사용부위 : 우유)                           |          |

【성 상】 옅은 황갈색의 분말이 든 상부는 황갈색, 하부는 미황색(연노랑)의 경질캡슐제

【효능·효과】 설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 식체(체함), 묽은 변, 토사

## 【용법·용량】

성인 : 1회 2캡슐, 1일 3회 복용, 11~14세 : 1회 1~2캡슐, 1일 2회 복용, 8~10세 : 1회 1캡슐, 1일 3회 복용  
복용 간격을 4시간 이상으로 한다.

## 【사용상의 주의사항】

### 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부, 신생아
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

### 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 약으로 일레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 발열을 수반하는 설사환자, 고령자(노인), 혈변환자 또는 점액변이 계속되는 환자
- 3) 위·십이지장장애 등이 있는 환자
- 4) 소아
- 5) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자

### 3. 이상반응

- 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 2) 이 약을 투여하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타날 수 있다.

### 4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여한다.

- 3) 급성의 심한 설사를 할 경우 또는 구역, 복통(배아픔), 복부(배부분) 팽만 등의 증상을 수반하는 설사를 할 경우에는 이 약으로無理하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있으므로 이러한 경우에는 투여에 대하여 약사 또는 의사와 상의한다.
- 4) 투여 시에는 음주하지 않는다.
- 5) 수화(여러 차례)간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 6) 3일 이상 계속하여 투여하지 않는다.
5. **상호작용**  
위장진통·진경(경련완화)제와 병용(함께 복용(사용))투여하지 않는다.
6. **소아에 대한 투여**  
이 약은 7세 이하의 영아(갓난아기), 유아에게 투여하지 않는다.
7. **저장상의 주의사항**
  - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
  - 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
  - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다

#### **[저장방법 및 사용기간]**

밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

#### **[포장단위]** 10캡슐

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 우수 의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 파손되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr> → 정보마당 → 의약품등 정보)을 참조하세요.
- ※ 본 제품 첨부문서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.arlico.co.kr](http://www.arlico.co.kr))의 제품정보 또는 제품문의처 전화(080-585-0004)를 통해 확인할 수 있습니다.

개정년월일 : 2011. 11. 11.



충북 진천군 광혜원면 회죽리 160-17  
<http://www.arlico.co.kr>

SI12149/01