

* 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

2B402M32403



아미나엑스정

(니코틴산아미드)

일반의약품

[성분·함량] 1정 중

유효성분 : 니코틴산아미드(KP) 500mg

첨가제(타르색소) : 황색4호 AL-LAKE, 황색5호 AL-LAKE

기타첨가제 : 라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 베타덱스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이III
노란색(85F12380), 이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 포비돈

[성상] 노랑색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과] 니코틴산아미드 결핍의 치료

[용법·용량] 성인 1일 1회 1정을 물과 함께 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임상적 경험이 없기 때문에, 니코틴산아미드
결핍이 명확히 확인된 경우를 제외하고는 복용을 권장하지 않습니다.)

3) 수유부(수유 중에는 복용을 권장하지 않습니다)

4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기
병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에
과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 흉조, 가려움증

2) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance
impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia:
혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

3) 우발적으로 과량 복용한 경우

4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

2) 여러 약물 간 발생할 수 있는 상호작용을 방지하기 위해, 처방중인 다른 치료에 대해
의사나 약사에게 반드시 알려야 합니다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아
보관하십시오.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법 및 사용기간] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

[포장단위] 100정/병

[제품문의] (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

※ 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품일
경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 또는 14-3330)

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지 또는
식품의약품 안전처 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 통하여 확인할 수 있습니다.

[연구·개발] 셀가디언(주) www.cellguardian.co.kr

[제조·판매]  코스닥상장 **신일제약(주)**

본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272

공장 : 충청북도 충주시 양성면 북상골길 28



설명서 개정년월일: 2024.03.19