

고단위소화효소제

체스판-에스 정



CHESPAN-S Tabs.

문명의 발달에 따라 질병의 발생도 다양화되고 만성화되는 경향이 두드러지고 있습니다. 특히 식생활의 고급화와 다양화로 인한 과음, 과식은 소화불량의 원인이 되고 소화불량은 영양섭취의 불균형과 질병발생의 원인이 되고 있습니다. 체스판-에스정은 소화제의 기본조건인 '신속하고' '자율적' 소화능력의 확실한 보조 등 2중효과를 충분히 발휘할 수 있게 처방된 고단위 소화효소제입니다.

【성 상】 연두색 타원형의 필름코팅정

【원료약품의 분량】 1정중

디아스타제·프로테아제(KP) 20mg
 (α-아밀라제(전분 호정화 효소) 2,000단위
 β-아밀라제(전분 당화 효소) 240단위
 프로테아제(단백질 분해 효소) 640단위)

메타구산알루민산마그네슘(KP) 100mg

탄산수소나트륨(KP) 250mg

첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

첨가제(타르색소): 청색1호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크, 황색5호 알루미늄레이크

【특 장】

체스판-에스정은 위내 소화효소군의 소화력을 보조하여 단백질 탄수화물 등 음식물의 소화를 확실하게 도와줍니다.

체스판-에스정은 위산을 적절히 중화하여 위산과다에 의한 소화불량을 개선합니다.

체스판-에스정은 소화작용과 식욕증진작용의 2중효과가 있습니다.

【효능·효과】

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】

성인 1회 1~2정 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 신장장애(신장장애) 환자 2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
 3) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

1) 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

5. 소아에 대한 투여

1) 이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 2) 직사광선을 피하고 되도록(습기가 적은) 서늘한 곳에(밀전하여) 보관한다.
 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】자사포장단위

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

설명서개정연월 : 2015년 01월

제품문의 (032) 812-8356



제조발매원

영풍제약주식회사

인천광역시 남동구 함박로 333