



폴시드[®]정 0.4 밀리그램

Folcid Tab. 0.4 mg (Folic acid)

(폴산(엽산))

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

폴산(엽산) (KP) 0.4 mg

【효능 및 효과】 1. 임신 계획이 있는 여성에서 태아 신경관 결손의 1차 예방을 위한 폴산 보충
2. 식사로부터 폴산의 섭취가 불충분한 경우의 폴산 보충

【용법 및 용량】 1일 1회 1정을 복용한다. 임신 계획이 있는 여성의 경우, 임신 전 1개월부터 임신 후 3개월까지 복용한다.

【성 상】 연노랑의 원형 정제

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포 장 단 위】 90정

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 비타민 B12 결핍으로 인한 악성빈혈 또는 거대적아구성빈혈
- 3) 이 약은 유당수화물(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 악성빈혈 환자투여 시, 혈액상태는 개선되나 신경증상에는 효과가 없으므로 비타민 B12 제제를 병용(함께 복용)할 것. 단, 진단이 확립되지 않은 악성빈혈 환자의 경우 혈액상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하여 진단 및 치료에 영향을 줄 수 있으므로 주의할 것.)
- 3) 이전 임신에서 신경관 결손 발생의 경향이 있거나 가족력이 있는 자
- 4) p-아미노살리실산, 경구용 피임제, 디하이드로폴레이트 환원효소 저해제(억제제)(메토트렉세이트, 트리메토프림 등)를 복용 중인 환자(비활적하지 않은 상호작용을 초래할 수 있다.)
- 5) 페니토인 같은 히단토인계, 카바마제핀, 프리미돈, 페노바비탈 성분의 항간질(간질)제를 복용 중인 환자(약물의 혈중농도를 감소시켜 발작빈도를 증가시킬 수 있다.)
- 6) 설파살리진, 콜레스티라민을 복용 중인 환자(이 약의 위장관(장자) 흡수를 저해(억제)할 수 있다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 홍반(붉은 반점), 피부발진, 가려움증, 전신권태, 호흡곤란 등의 알레르기 증상
- 2) 식욕부진, 구역·구토, 부종(부기), 체중감소
- 3) 위장관(장자)장애, 수면변화, 집중부족, 과잉행동, 과민성, 흥분, 우울증, 혼란, 판단력 장애 등의 중추신경장애(고용량(1일 15 mg 이상)에서 나타날 수 있다.)

4. 기타 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【제조사】 조아제약(주) (인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>)

본사: 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7 공장: 경남 함안군 함안면 파수리 465

【수신자부담고객상담실】 080-988-8889

※ 기타 상세한 것은 의사, 또는 약사의 지시에 따르십시오.

※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 곳에서 교환해 드립니다.

※ 본 표시사항은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)—[정보마당]—[의약품 등 정보]를 참조하십시오.

※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청에 전달하십시오.

문안작성일: 2011. 11. 16 (Rev.0)