

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(700mg) 중

푸마르산철(KP)	88.50mg(철로서29.09mg)
폴산(KP)	0.40mg
시아노코발라민1000배산(KP)	10.00mg(시아노코발라민으로서10ug)
아스코르브산(KP)	100.00mg

첨가제(착색제) : 카카오색소, 치자청색소

첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 가축)

[성상] 적갈색의 내용물을 함유한 알갈색의 타원형 연결캡슐

[효능·효과]

1. 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

2. 다음 경우의 비타민C의 보급 -육체피로 -임신·수유기 -병중·병후병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하시

[용법·용량] 12세 이상 어린이 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐을 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고 : 만 6세 이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 2) 만 1세 미만의 영아(갓난아기) 3) 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이차)에 침착하는 질환), 헤모시데린 침착증, 비철결핍성 빈혈 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 과산화노증환자(hyperoxaluria : 뇨 중에 과량의 수산화물이 배설되는 상태) 3) 임부, 수유부 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환이 있는 환자 5) 심장·순환기계기능 장애 환자 6) 신장애(신장장애) 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이차)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 이상 반응

1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다. ① 구역, 구토, 설사 ② 두드러기, 가려움증, 광선과민증, 복부(배부분)·위통증, 경련, 열, 혼수 ③ 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 3) 폴산이 부족한 환자에는 비타민B₁₂를 1일 10ug이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다. 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다. 3) 1개 월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다. 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 상호 작용

1) 할알도스테론제, 트리암테네과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다. 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 않는다. 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

7. 임상검사치에의 영향

각종 요검사에 해당항의 검출을 방해할 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다. 3) 오용(잘못 사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[포장단위] 30캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[제조·판매처] 광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114

[제조자] (주)알파바이오 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. * 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해드립니다. * 본 지침 부분서의 내용은 최신정보 및 허가정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 콜로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다. * 본 제품은 영·유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. * 본 제품을 복용할 때 캡슐이 기도에 걸릴 수도 있으니 유의하시기 바랍니다. * 본 캡슐의 포장용기(PTP)를 개봉할 때 손에 상처가 생길 수도 있으니 유의하시기 바랍니다.

작성일 : 2016.08.19

HL160819-003.RP