

Censio Tab

Centella asiatica

정맥 순환부전 개선제 센시아정


동국제약 Dongkuk Pharmaceutical

목차

질환정보	03p
센시아 제품개요	13p
센시아 제품정보	14p


인체의 순환계

인체의 순환계는 혈액이 이동하는 혈관계와 림프액이 이동하는 림프관계로 구분됩니다. 혈관계는 혈액이 심장에서부터 나오는 동맥과 조직과 상호작용하는 모세혈관, 심장으로 향하는 정맥으로 구분됩니다.



동맥과 정맥의 차이

동맥은 심장에서부터 강한 압력으로 혈액이 이동하기 때문에 정맥에 비해 직경이 작지만 탄성막이 발달되어져 있는 반면 정맥은 심장으로 향하기 때문에 압력이 약하여 혈액이 역류하지 않도록 판막이 있으며 탄성막보다는 결합조직이 두꺼운 특징이 있습니다.




정맥질환: 정맥, 림프 순환부전?

정맥, 림프 순환부전은 정맥의 판막이상*과 림프관으로의 체액 환류 이상**이 발생하여 혈액 및 체액이 저류되어 심장 쪽으로 제대로 이동하지 못해 발생하는 질환으로 만성 정맥 부전(Chronic Venous Insufficiency; CVI)이라고도 합니다.


* 정맥의 판막이상

정맥은 판막이 있어 혈액의 역류를 방지하여 한 방향으로 흐르도록 해주지만 정맥의 결합조직이 약해지면 정맥벽이 확장되고 늘어나 판막이 제 역할을 못해주어 혈액이 거꾸로 향하게 됩니다.

건강한 정맥




건강하지 못한 정맥



** 림프관으로의 체액 환류 이상

모세혈관의 투과성 향진이 발생하여 비정상적으로 체액이 조직으로 유입되고 유입된 체액이 림프관으로 환류되지 않아 조직 내 체액이 저류되어 부종이 발생하게 됩니다.



원인 및 유병율

정맥, 림프 부전의 원인

가족력, 노화, 만성질환, 비만, 임신, 월경전 증후군, 호르몬 복용, 폐경(여성갱년기) 증후군, 배변습관 및 식이습관, 직업 및 자세 등이 있습니다.

정맥, 림프 부전은 전 인구의 30% 정도가 겪는 것으로 나타나 있으며 연령이 증가할수록 유병율은 증가합니다.

남여 모두에게 나타나나 여성에게 빈번하게 나타나는 것으로 보고되어 있습니다.


증상 지속 진행시 발병 질환



정맥, 림프 부전이 지속되면
심장으로 혈액이 원활하게 돌아가지 않아
혈액 순환 등의 문제가 생길 수 있으며
그대로 방치하면
다리 혈관이 울퉁불퉁하게 보이는
하지정맥류, 증중습진, 다리궤양 등이
발생할 수 있습니다.

예방 및 치료

예방 및 치료를 위해서는 체중 조절, 음식조절, 운동,
다리올리기, 편안한 신발 신기, 과도한 음주 및 흡연
자제 하기 등 생활 요법이 있으며
이와 함께 적절한 약물치료를
하는 것이 효과적입니다.



센시아정

센시아 정은
유럽에서 개발되어 국내에 도입되는 새로운 약물로 다수의 임상연구 및
유럽에서의 사용을 통해 정맥, 림프 순환부전에 효과와 안전성이 입증된 치료제입니다.

센시아 정은
식물성분인 센텔라 아시아티카 정량추출물을 주성분으로 하고 있어
장기 투여시에도 안전합니다

센시아 작용기전

- 센시아 정은 정맥의 결합조직을 강화시켜주어 정맥벽의 강도 및 탄력을 증가시켜 줍니다
- 센시아 정은 모세혈관 투과성을 정상화시켜줌으로써 림프관 및 정맥으로의
체액 환류를 정상화시켜 줍니다.
- 센시아 정은 항산화효과를 통해 조직보호 및 염증을 완화시켜 줍니다.

정맥 탄력 향상

모세혈관 투과성 정상화

항산화 효과

“센시아 정은 정맥의 팽막 이상 및 림프관으로의 체액 환류 이상을
정상화함으로써 정맥, 림프 순환부전 증상을 개선시켜 줍니다.”

센시아 복약안내

- **용법, 용량에 맞추어 매일 복용하기**
1일 1회 1정씩 복용하며 필요시 1일 1회 2정씩 복용합니다.
- **식사시 복용하기**
효과 극대화를 위해 식사시 복용합니다.
- **중단하지 말고 꾸준히 복용하기**
정맥, 림프 순환부전은 만성질환이므로 중단하지 말고 꾸준히 복용하시는 것이
 좋습니다.

센시아 제품 정보

【원료약품 및 그 분량】

센텔라아시아티카 정량 추출물 ... 30mg, 오파드라이 II 녹색 85F41079

【성 성】 연두색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 정맥질환 : 정맥, 림프 부전과 관련된 증상의 개선 (하지둔중감, 통증, 하지불온증상)

【용법·용량】 성인 : 1일 1~2정, 식사와 함께 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 2) 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase

deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전
적인 문제가 있는 환자

- 3) 임신부, 수유부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 또는 임신할 계획이 있는 여성
- 2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
다른 의약품을 복용하고 있을 경우
- 3) 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상임시
가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 1) 드물게 구토, 식욕부진 등이 나타날 경우
 - 2) 드물게 알러지 반응이 나타날 경우
 - 3) 드물게 가려움증과 광과민반응(햇볕에 의한 피부 민감성이 높아져 발적, 발진 발생)이 나타날
경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 권장 복용량 이상 복용하지 말 것
- 2) 단기간만 사용할 것. 질환이 재발하거나, 최근에 증상의 변화를 인지한 경우 의사 또는 약사와
상의할 것.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생의
원인이며, 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
 - 3) 포장지에 표기된 사용기간이 지난 후에는 사용하지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁 해결기준에
의거 보상받을 수 있습니다.

만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는
는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식약청 의약품사이트(<http://ezdrug.kdga.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품에 관한 의사사항은 동국제약(주) 소비자상담실(☎080-777-5678, 수신사 요금 부담)로
문의하십시오.

설명서 개정년월일 : 2012.03.23