

포슈인정

(아세트산칼슘)

【원료약품 및 그 분량】1정 중

- 유효성분 : 아세트산칼슘(USP) 710mg
- 첨가제(동물유래) : 스테아르산칼슘(소, 돼지-기름)
- 기타첨가제 : 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 포비돈

【성상】

흰색의 원형 정제

【효능·효과】

말기 신부전환자의 고인산혈증

【용법·용량】

- 1) 초기용량: 매 식사 중 2정씩 경구로 복용한다.
- 2) 유지용량: 고칼슘혈증을 유발하지 않는 상태에서 혈중 인산의 농도가 6mg/dl 이하가 될 때까지 용량을 점차 증가시킨다. 통상 식사중 3~4정을 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것
고칼슘혈증 환자
2. 부작용
고칼슘혈증을 유발할 수 있으며, 경증의 고칼슘혈증(Ca)10.5mg/dl)은 무증상이거나 변비, 식욕부진, 오심, 구토를 일으킬 수 있으며, 중증은 착란, 지각상실, 혼수 등을 일으킬 수 있다. 경증일 경우는 복용량을 줄이거나 복용을 중지하고, 중증일 경우는 복용을 중지하고 혈액투석을 실시한다.
3. 일반적 주의사항
1) 이 약의 복용량은 초기에 결정하여 필요에 따라 조정한다.
2) 이 약의 과량투여는 고칼슘혈증을 유발할 수 있으므로 용량을 결정하는 치료초기 단계에 혈중 칼슘농도를 1주일에 2회 측정한다.
3) 고칼슘혈증은 심부전맥을 촉진할 수 있기 때문에 디기탈리스를 부여하는 환자에게는 이 약을 투여하지 않는다.
4) 혈중 인산농도는 정기적으로 측정하여야 한다.
5) 비 처방된 제산제의 복용을 피한다.
6) 인산과 결합된 혈중칼슘은 66을 넘지 않아야 한다.
4. 상호작용
이 약은 테트라사이클린의 생화학적 활성을 낮출 수 있다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 이 약을 투여하여 실시한 동물시험에서는 최기형성이 나타나지 않았으나, 임부에게 투여할 경우에는 유약성이 위험성을 상회할 경우에만 투여한다.
2) 소아에 대한 안전성과 유효성이 아직 확립되어 있지 않다.
6. 기타
고칼슘혈증의 증상을 환자에게 인지시켜 주의하도록 한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 30정/병, 500정/병

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기간이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통해 교환해드립니다.
- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 개정일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 의약품 피해구제 상담번호 : 14-3330

개정년월일 : 2021. 08. 31

【제조사】  **한중제약**전라북도 원주군 봉동읍 원주산단6로
301 1~3층, 5층, 봉동로 705【판매원】 **命藥메디칼(주)**

경기도 부천시 민곡로1103층 301호