

디멘정

【원료약품 및 그 분량】1정 중

- 유효성분 : 디멘히드리네이트(KP) 25mg
카페인무수물(KP) 30mg
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

【성상】흰색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】멀미에 의한 어지러움·구토·두통의 예방 및 완화

【용법·용량】

멀미의 예방에는 승차 30분에서 1시간 전에 연령에 따라 다음과 같이 복용한다. 또 증상 발현시에 추가 복용할 경우에는 1회 복용량을 추가 복용하되 4시간 이상 간격을 두고 복용하고 1일 복용횟수는 3회를 한도로 한다.

만 15세이상 : 1정

만 11세이상 - 만 15세미만 : 2/3정

만 7세이상 - 만 11세미만 : 1/2정

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 수유부

2) 만 7세 이하의 어린이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

1) 다른 진통제, 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제, 진해거담제 등

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

3) 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 환자, 배뇨장애 환자

4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

5) 폐기종 혹은 만성 기관지염과 같은 호흡기 질환을 앓고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용함으로써 발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등이 나타날 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.

3) 이 약을 복용함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의할 것.

4) 이 약을 복용하는 동안 알코올 음료를 마시지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】300정/병

【저장방법 및 사용(유효)기간】밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

【제조사】(주)바이넥스 부산광역시 사하구 다대로 368-3

* 본 의약품은 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 약을 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다.

* 첨부문서의 개정연월일 이후로 변경된 허가사항은 의약품안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 혹은 당사 홈페이지(<http://www.bi-nex.com>)나 전화(080-263-3151)로 문의하시면 확인하실 수 있습니다.

* 의약품 피해구제 상담 / 부작용 신고·피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원(14-3330 / 1644-6223)

* 소비자 상담전화 : 080-263-3151

* 본 문서에는 부산바다체와 고양일산체가 사용되었습니다.