

자임큐텐



[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,586mg) 중

토코페롤아세테이트(KP)	200mg
(비타민E로서 200I.U.)	
아스코르브산(KP)	500mg
베타카로틴30%현탁액(KPC)	10mg
(베타카로틴으로서 3mg)	
유비데카레논(KP)	10mg
산화아연(KP)	17.43mg
(아연으로서 14mg)	
셀레늄0.1%가루(KPC)	25mg
(셀레늄으로서 25μg)	
우르소데옥시콜산(KP)	10mg
푸르셀티아민(KPC)	10mg

첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호, 황색5호
첨가제(동물유래) : 숙신산젤라틴(기원 : 소, 사용부위 : 가죽)

[성상] 적갈색의 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 A, C, B₁, E 보급
 - 육체피로 • 임신 • 수유기
 - 병중 • 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 • 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 눈의 건조감의 완화 • 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상)
 - 햇빛 • 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화 • 잇몸 출혈 • 비출혈(코피) 예방
 - 말초혈행장애 및 갱년기 시 다음 증상의 완화 : 어깨 • 목결림, 수족저림 • 수족냉증(손발이 차가움)

[용법·용량]

12세 이상 및 성인 1일 1회 1캡슐

[사용상 주의사항]

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것. (비타민 A결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 : 외국에서 임신 전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍 증치로에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장 • 순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장(콩팥)장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 위부 불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은변, 구내염(입안염), 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관 장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증(혈관 막힘증)의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 장기간 고용량의 비타민A(비타민A로 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈엉성증) 위험을 높일 수 있다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용)) 투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 8) 우발적으로 과량복용한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 한다.
- 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피할 것
- 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 자사포장단위

[제조사] (주)서흥캡셀 경기도 부천시 소사구 송내1동 315 317번지

[날알모음포장(PTP)의 제조번호 사용기한 보는 법]

예를 들어 "1201 20140101"로 표기된 경우, 앞 네자리 "1201"은 제조번호, 뒤 여덟자리 "20140101"은 사용기한 "2014년 01월 01일"을 각각 의미함.

※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 또는 오염되고 손상된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거, 구입하신 약국에서 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자 상담실(☎080-001-0795) 또는 식약청 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)사이트의 의약품 정보란에서 확인할 수 있습니다.

작성일자 : 2012년 05월 16일

제조의뢰 및 판매자



주비티오제약

경기도 이천시 부발읍 가신리 491-7
www.btopharm.com