




분류번호 : 316(혼합비타민제)

● 베콤씨 이브 개요 및 특징

비타민은 우리 몸의 생리기능을 조절하고 대사를 원활하게 하는 필수 영양소입니다. 베콤씨이브는 이러한 비타민 중 특히 현대인의 스트레스 및 불균형적인 식사에 의해 부족하기 쉬운 비타민B군과 비타민C를 함유하여 필수영양소를 효과적으로 공급해줄 수 있는 비타민제입니다. 특히 베콤씨이브는 항산화제인 토코페롤, 코엔자임과 필수 미네랄인 마그네슘, 철분, 칼륨이 보강되어 있어, 여성에게도 좋은 효과를 나타냅니다.



● 성분 · 함량 1정 중

아스코르브산97%과립(별규)	515.5mg
(아스코르브산으로서 500mg)	
티아민질산염(KP)	15mg
피리독신염산염(KP)	5mg
리보플라빈(KP)	15mg
판토텐산칼슘(KP)	20mg
니코틴아마이드(KP)	25mg
토코페롤아세테이트50%(KPC)	60mg
(토코페롤아세테이트로서 30IU)	
폴산(KP)	0.4mg
시아노코발라민1%(별규)	1.2mg
(시아노코발라민으로서 12μg)	
유비데카레논10%(별규)	100mg
(유비데카레논으로서 10mg)	
푸마르산철(KP)	55.3mg
(철로서 18mg)	
산화마그네슘(KP)	100mg
(마그네슘으로서 60mg)	
염화칼륨(KP)	38.2mg
(칼륨으로서 20mg)	

● 성상

적갈색의 타원형 제피정

앞면	뒷면	측면
B I E	Y H	

● 효능 · 효과

- 다음경우의 비타민 E, B1, B2, B6, C의 보급
 - 육체피로, 임신 · 수유기, 노년기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염, 햇빛 · 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화 · 잇몸출혈 · 비출혈(코피) 예방
- 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

- **용법 · 용량** 만 12세 이상 및 성인: 1일 1회 1정 복용 ※충분한 양의 물과 함께 복용하시기 바랍니다.
- **사용기한** 외부포장에 표기
- **포장단위** 100정
- **사용상의 주의사항**

1) 경고

철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (3) 고칼륨혈증 환자
- (4) 철색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- (5) 심한 중상의 신부전 환자

3) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 인신염, 갈슘염, 경구(먹는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

4) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- (4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- (5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- (6) 신장(콩팥)장애 환자
- (7) 저단백혈증 환자
- (8) 알칼리증, 소화성궤양 환자
- (9) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- (10) 임부

5) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부(배부분) · 위통증, 경련, 열, 혼수, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 고칼륨혈증, 가스참, 위장통증
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- (5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- (6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- (7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- (8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- (9) 할랄도스테로네, 트리암테네과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- (10) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- (2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- (4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

7) 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

● 저장방법

차광 기밀용기 실온보관

※정제를 깨면 후에는 뚜껑을 꼭 닫아주십시오.(본 제품은 습기가 많은 곳에서는 보관중 인습(흡습)되어 변색될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.)

※빈 용기는 분리수거하여 주십시오.

※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환 하여 드리며, 정부의 '소비자분쟁해결기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여드립니다.

※ 이 설명서의 최근 변경된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.



제조판매원

유한양행

본사 : 서울특별시 동작구 노량진로 74

공장 : 충북 청원군 오창읍 연구단지 219

소비자상담실 : 080-024-1188

홈페이지 : www.yuhan.co.kr

문안작성년월일 : 2012. 02. 21

YJ432592/01B