

고단위 종합비타민 영양제 겔티포르테 연질캡슐

GELTI-forte Soft Capsule

날로 복잡 다양해지는 현대인의 일상생활은 끊임없이 부딪치는 정신적, 육체적 스트레스와 불규칙한 식사 및 생활환경, 심신의 과로, 과도한 음주, 흡연, 미래에 대한 불안 등으로 신체내의 많은 영양분을 소모시켜 남녀노소를 막론하고 쉽게 피로하고 매사에 싫증이 나며, 권태감이 자주오고 어깨가 결리고 머리가 무거우며, 손발이 차고 잠이 잘 오지 않으며, 피부가 거칠어지는 등 영양결핍현상이 나타나게 됩니다.

겔티포르테 연질캡슐은 결핍되기 쉬운 비타민 등을 인체의 생리기능향상에 필요한 성분을 합리적으로 처방하여 이용률을 극대화 시켰으므로 생체 요구량이 많아지게 되는 성장기 어린이나 수험생, 병후 회복기나 수술전후의 환자, 노약자, 임신·수유기, 과도한 정신적, 육체적 노동을 하는 분 등 특히 환절기에 신체적인 리듬에 이상이 있는 분들의 이상적인 종합 영양제입니다.

【특 점】

1. Total nutrient supplement 입니다.
겔티포르테연질캡슐은 비타민의 전형적 결핍증상만의 예방 및 치료를 위해서 처방되어 온 종래의 요법원리 차원을 높여, 임상 영양학적 최신 이론을 기초로 하여 디자인된 종합영양제입니다.
2. 건강의 균형을 바로 잡습니다.
겔티포르테연질캡슐은 고단위 비타민을 알맞게 배합시켜 건강균형을 바로잡는 이상적인 종합영양제입니다.
3. 생체이용도를 극대화시켰습니다.
겔티포르테연질캡슐은 필수적인 영양소를 안전성과 흡수율, 조직이용도 등을 극대화시킨 Paste-Phase의 연질캡슐입니다.
4. 영양소의 생체 일일요구량(Recommended Daily Allowance)을 충족시킵니다.
건강이 고르지 못한 반건강상태에 있는 분, 잔병이 자주 걸리고 항상 피로를 느끼는 분, 심한 정신 및 육체노동자, 임신부 공부에 열중하는 학생들은 생체기능 유지에 반드시 필요한 영양소가 일일요구량에 부족 되기 쉽습니다.

【성 상】 담황색의 유상물질이 든 일면 주황색, 다른 일면은 갈색의 연질캡슐체

【원료약품의 분량】 1연질캡슐 중

레티놀팔미테이트 Retinol palmitate (KP)	2.352mg
(비타민A로서 4,000 IU)	
에르고칼시페롤 Ergocalciferol (KP)	5mcg
(비타민 D로서 200IU)	
티아민염산염 Thiamine HCl (KP)	15mg
리보플라빈 Riboflavin (KP)	6mg
피리독신염산염 Pyridoxine HCl (KP)	10mg
시아노코발라민 Cyanocobalamin (KP)	2.5mcg
아스코르브산 Ascorbic acid (KP)	75mg
토코페롤아세테이트 Tocopherol acetate (KP)	50mg
니코틴산아미드 Nicotinamide (KP)	50mg
판토텐산칼슘 Cal-pantothenate (KP)	15mg
콜린타르타르산염 Choline tartrate (DAB)	12.5mg
이노시톨 Inositol (KP)	12.5mg
폴 산 Folic acid (KP)	50mcg
r-오리자놀 r-Oryzanol (KP)	3mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸 (KP)	0.1mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필 (KP)	0.01mg
첨가제(동물유래): 젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 피부)	
첨가제(타르색소): 청색 1호, 적색 3호, 황색 5호, 황색 4호(타르트라진)	

【용법·용량】

* 성인 1회 1캡슐씩 1일 2회 복용한다.

【효능·효과】

- * 다음 경우의 비타민(A, D, E, B₁, B₂, B₆, C)의 보급
 - 육체피로, 임신·수유기, 병중병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기
- * 이 약에 함유된 비타민 등의 효능효과는 다음과 같다.
 - 다음증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못보는 증상), 각기, 눈의 피로
 - 뼈, 이의 발육발량, 구루병의 예방
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨목결림, 수족(손발)저림, 수족냉증(손발이 차가움)

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인의약도서관(<http://durg.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.
- * 이 약을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

제품문의 032)812-8356

설명서개정연월 2015년 01월



제조발매원
영풍제약주식회사
인천광역시 남동구 함평로 333



본 의약품은 정부의 KGMP (우수약품 관리기준)에 의거하여 엄격한 관리에 의해 생산된 제품입니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경 고
 - 1) 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발한 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 말 것. (비타민A결핍증 환자는 제외)
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유클로이드(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염종결핵), 신장질환 환자.
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 3개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장결석 환자
 - 5) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 레보도파
4. 신중투여
 - 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 2) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 3) 이 약은 황색5호(선헤트올루FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
5. 일반적 주의
 - 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검 할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
6. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 고옥살산뇨증환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아(갓난아기, 젖먹이)
 - ① 외국에서 임신 전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주 의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
 - ② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 4) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
 - 5) 신장결석 병력이 있는 환자
7. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 붉은 변, 식욕부진, 복부팽만감
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 8) 장기간 고용량의 비타민A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈형성증) 위험을 높일 수 있다.
 - 9) 우발적으로 과량 복용 한 경우
 - 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
8. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU이상을 넘지 않도록 한다.
 - 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있다.
9. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여)보관할 것
 - 3) 용유(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.