

네로민정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분
피리독신염산염(KP) 10mg
티아민질산염(KP) 1.5mg
시아노코발라민1000배산 6mg
리보플라빈(KP) 1.7mg
아스코르브산과립(별규) 61.86mg
폴산(KP) 1mg
d-비오틴(USP) 0.3mg
니코틴산아미드(KP) 20mg
판토텐산칼슘(KP) 10mg
- 첨가제(타르색소) : 황색4호, 황색5호, 황색203호
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 무수인산수소칼슘, 히드록시프로필셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 톨크, 콜로이드성이산화규소, 탭설드클리어(71C152), 탭설드주황색(790184)

【성상】 주황색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 투석환자, 만성신부전에 의한 질소혈증환자의 비타민 B, C 보충

【용법·용량】 성인 1회 1정, 1일 1회 복용.

【사용상의 주의사항】

- 경고
비타민 B12 결핍에 의한 악성빈혈에 염산을 사용하는 경우 부분적으로 혈액학적 증상을 호전(나아짐)시킬 수 있으나 신경학적 증상을 악화시키므로 비타민 B12 결핍성 악성빈혈에는 사용하지 말 것.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
2) 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
3) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
레보도파
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
2) 이 약은 황색5호(선택멜로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 고수산노증(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 환자
3) 임부 수유부
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 위부불쾌감, 위부팽만감, 복부팽만감
2) 알레르기성 과민증상
3) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성
4) 피리독신을 1일 50 mg~2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병 증(neuropathy :

말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)

- 5) 염산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 kg 이상 투여할 경우 혈액학적 이 상반응
- 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과량으로 존재하는 상태), 간손상
7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 의사의 지시에 따라 복용할 것.
2) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것.
3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
4) 임상검사치에의 영향
(1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
(2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
8. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관할 것.
3) 오남용을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 500정/병

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다.
- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

작성연월일 : 2019.05.16
PK-62548-002

【판매원】 **생명메디칼(주)**
서울특별시 강서구 양천로 108, A동 3F

【제조자】 **한국코러스**
충청북도 제천시 강저로 30