

액상이라 효과빠른
진해거담제
기가렉스 연질캡슐
GIGAREX Soft caps.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(565 mg) 중

L-카르보시스테인(KP)	125.00 mg
브롬헥신염산염(BP)	2.00 mg
착색제(천연색소)	락색소

【성상】 흰색의 내용물을 함유한 적색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】 가래, 기침을 유발하는 가래

【용법·용량】

성인 및 15세 이상의 소아: 1일 3회, 1회 2캡슐을 식후에 경구투여한다.(복용한다)

8세~14세 소아: 1일 3회, 1회 1캡슐을 식후에 경구투여한다.(복용한다)

【사용상의주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 이 약에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - 위·십이지장 궤양 환자
 - 8세 미만의 소아
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 - 다른 진해(기침을 그치게 함)·거담제(가래약), 감기약
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 노인
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 고열 증상이 있는 사람
 - 심장질환, 간질환 또는 중증(심한 증상) 신장(콩팥) 질환의 진단을 받은 사람
 - 위·십이지장 궤양의 병력이 있는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 복통(배아픔), 두통, 혈담
 - 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
 - 피부점막만중후군(스티븐스-존슨 중후군), 중독성표피괴사증후군(리엘 중후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같은 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
 - 속(아나필락시): 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은 땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - 간기능 장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있다.
 - 3~4일간 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
 - 다음의 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 계속되거나 심해지는 경우에는 이 약의 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것: 설사, 입안의 건조
 - 동물실험에서 브롬헥신염산염을 장기간 다량 연속 투여할 경우 혈청중에 아미노전이효소치와 가래양이 일시적으로 상승한다는 보고가 있다.
 - 이 약을 복용하면 일시적으로 가래 양이 증가하는 경우가 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) / 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

【사용기간】 제조일로부터 24개월까지

【포장단위】 10연질캡슐

【반품 및 교환처】 031-260-9300

【소비자상담실】 080-260-0033

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2014년 08월 14일)이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서 개정일 : 2014. 08. 14

제조사 **RP Corp** (주)알피 corp
경기도 화성시 향남읍 재막공단 4길 35-7

판매원  주식회사 **녹십자**
충북 음성군 금왕읍 두곡로 65번길 26