

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

전문의약품

월 1회 Vitamin D₃ 함유 골다공증 치료제

분류번호 : 399

리세넥스[®]M_{엠펙}정

Risenex-M Tab.

리세드론산나트륨(Sodium Risedronate)+콜레칼시페롤(Cholecalciferol)

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정 중

리세드론산나트륨25수화물(Sodium Risedronate Hemipenta hydrate)(USP)	172.1mg
(리세드론산나트륨으로서)	150mg)
콜레칼시페롤(Cholecalciferol)(EP)	0.75mg
(콜레칼시페롤로서)	30,000IU)
첨가제(식약청인정타르색소) : 청색2호 알루미늄베레이크	

【성상】 파란색의 타원형 필름코팅정제

【효능·효과】 폐경 후 여성의 골다공증 치료와 예방

【용법·용량】

- 성인 : 이 약 1정을 한 달에 한 번 경구투여한다.
- 고령자 : 고령자(60세 이상)에서 이 약의 생체이용률과 약동력은 젊은 사람들과 유사하기 때문에 용량을 조절할 필요가 없다. 이 약을 위(stomach)로 쉽게 도달시키고 식도 자극 가능성을 감소시키기 위해, 이 약은 똑바른 자세(upright position)로 충분한 양의 충분한 물을(170~230ml)과 함께 복용한다. 광천수를 포함한 다른 음료수와 함께 복용시 이 약의 흡수를 저하시킬 수 있다. 이 약은 구강인두의 궤양화 가능성 때문에 씹거나 빨아먹어서는 안 된다. 그리고 환자는 복용 후 최소 30분 동안 눕지 말아야 한다. 환자가 음식물로부터 칼슘 및 비타민D 섭취가 불충분할 경우 보충제를 복용해야 한다. 비타민D 결핍 위험이 큰 환자(예, 70세 초과 환자, 요양소에 있는 환자, 만성 질환자)는 비타민D 보충제의 추가적인 복용이 필요할 수 있다. 위장관 흡수장애 중증군이 있는 환자는 더 높은 용량의 비타민D 보충제를 복용할 수 있으며 25-hydroxyvitamin D 농도 측정을 고려하여야 한다. 일일 비타민D 권장량은 400IU에서 800IU이다. 이 약은 한달 1회 복용으로 일일 1000IU 비타민D 한달 분량을 제공한다. 환자가 정해진 복용일에 복용하는 것을 잊어버린 경우 다음과 같이 복용한다.
- 다음 복용일이 7일 이상 남았을 경우 이 약 1정을 기억한 그 다음날 아침에 복용하도록 한다. 다음 복용은 기존에 정해진 복용일에 다시 복용하도록 한다. 이 때 7일 안에 이 약 1정을 초과하여 복용해서는 안 된다.
- 다음 복용일이 7일 이내로 남았을 때는, 기존에 정해진 복용일까지 기다린 후 이 약 1정을 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
이 약은 다른 비스포스포네이트 제제와 마찬가지로 상부 위장관 점막에 국소 자극을 일으킬 수 있다. 경구용 비스포스포네이트를 투여받은 환자에서 때때로 출혈과 함께 식도염, 식도궤양, 식도미란과 같은 식도 이상반응이 보고된 바 있으며, 드물게 식도폐색 또는 천공으로 발전하였다. 일부 환자에서는 증상이 심하여 입원을 요하는 경우도 있었다. 그러므로 의사는 식도 반응의 조짐을 보이는 모든 증상 및 증후에 대해 주의를 기울여야 하며, 환자에게 연하곤란, 연하통 또는 흉골후방의 통증, 속쓰림의 발생 또는 악화와 같은 증상이 있을 경우 복용을 중지시키고 의사와 상의하도록 지시해야 한다. 이 약을 복용한 후 누워 있거나, 이 약을 충분한 양의 물(170~230ml)과 함께 복용하지 않았거나, 식도자극의 증상이 나타난 후에도 계속해서 이 약을 복용한 환자에서 심각한 식도 이상반응의 위험은 훨씬 커진다. 그러므로 용법·용량을 환자에게 잘 설명하고 이해시키는 것이 매우 중요하다(용법·용량 참조). 정신적 장애로 지시된 용법을 따르지 못하는 환자에 대한 이 약의 치료는 적절한 지도감독 하에 이루어져야 한다. 경구용 비스포스포네이트는 상부 위장관 점막을 자극시킬 수 있으므로 연하곤란, 식도질환, 위염, 십이지장염 또는 궤양과 같은 상부 위장관 질환이 있는 환자에서 투여할 경우 주의해야 한다. 외국의 시판 후 조사에서 경구용 비스포스포네이트 투여 시 일부 중증의 합병증을 수반한 위궤양 및 십이지장 궤양이 발생한 사례가 보고된 바 있다. 대조임상시험에서는 이러한 위험성의 증가가 확인되지 않았다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 식도협착 또는 무이완증과 같이 식도 배출을 지연시키는 식도이상 환자
- 2) 이 약의 주성분이나 첨가제에 과민반응이 있는 환자
- 3) 저 칼슘혈증 환자
- 4) 30분 이상 똑바로 앉거나 설수 없는 환자
- 5) 일부 및 수유부
- 6) 중증 신장애 환자 (크레아티닌 청소율이 30ml/min미만인 자)

3. 이상반응

- 1) 임상시험에서 나타난 리세드론산나트륨5mg을 투여한 군에서는 이상반응은 위약군과 유사하였다. 대부분의 이상반응은 경증 또는 중등도였고, 이로 인해 치료를 중단한 환자는 없었다. 중증의 이상반응을 나타난 환자는 위약군에서 24.9%로 리세드론산나트륨5mg을 투여한 환자(26.3%)와 유사하였다. 이상반응으로 인해 시험을 중단한 환자는 위약군과 리세드론산나트륨5mg을 투여한 환자에서 각각 14.4%, 13.5%였다. 2% 이상의 빈도를 나타내고, 리세드론산나트륨5mg을 투여한 군보다 빈번하게 나타난 이상반응은 아래와 같다.

골다공증에 대한 3상 임상시험에서 위약과 비교시 리세드론산나트륨정 투여군에서 보다 빈번하게 나타나는 이상반응 발현율 (2% 이상)			
	전신계	위약 % (1914명)	리세드론산나트륨정 5mg 투여군 % (1916명)
전신계	감염	29.7	29.9
	오통	23.6	26.1
	동통	13.1	13.6
	복통	9.4	11.6
	목부위 통증	4.5	5.3
	무력감	4.3	5.1
	홍통	4.9	5.0
	신생물	3.0	3.3
	허니아	2.5	2.9
	심혈관계		
심혈관계	고혈압	9.0	10.0
	심혈관질환	1.7	2.5
	협심증	2.4	2.5
소화기계	오심	10.7	10.9
	설사	9.6	10.6
	고창	4.2	4.6
	위염	2.3	2.5
	위장관질환	2.1	2.3
	직장질환	1.9	2.2
	과다질환	2.0	2.1
	혈액·림프계		
	반상출혈	4.0	4.3
	빈혈	1.9	2.4
근골격계	관절통	21.1	23.7
	관절 이상	5.4	6.8
	근육통	6.3	6.6
	골통증	4.3	4.6
	골이상	3.2	4.0
	다리경련	2.6	3.5
	혈액농염	2.9	3.0
	건이상	2.5	3.0
	신경계		
	우울증	6.2	6.8
신경계	현기증	5.4	6.4
	불안감	4.5	4.7
	신경통	3.0	4.3
	신경통	3.5	3.8
	현훈	3.2	3.3
	긴장화진	2.1	2.2
	감각이상	1.8	2.1
	호흡기계		
	인두염	5.0	5.8
	비염	5.0	5.7
폐경 및 부속기계	호흡곤란	3.2	3.8
	폐렴	2.6	3.1
	발진	7.2	7.7
	가려움증	2.2	3.0
	피부암	1.8	2.0
	특수감각계		
	백내장	5.4	5.9
	결막염	2.8	3.1
	중이염	2.4	2.5
	비호생식기계		
	요로감염	9.7	10.9
	방광염	3.5	4.1

때때로 (0.1~1%) 심아지장염과 설염이 나타났다. 드물게(0.1%) 비정상적인 각 기능 검사 결과가 보고되었다.

임상검사 : 수치는 무증후성(asymptomatic)의 혈중 칼슘과 인의 농도가 약간 감소하였다. 리세드론산나트륨정5mg을 6개월 동안 투여 받은 환자에게서 혈중 칼슘농도는 평균 0.8%, 혈중 인농도는 평균 2.7% 감소하였다. 리세드론산나트륨정5mg을 투여받은 군과 대조군 모두에게 9명(0.5%)씩 모두 18명에서 혈중 인농도가 8mg/dl이하로 나타났다. 혈중 인 농도 2mg/dl이하로 나타난 환자는 14명으로 리세드론산나트륨정5mg을 투여받은 환자에게 11명(0.6%), 대조군 환자에게 3명(0.2%)이었다. 내시경 소견에서 임상시험에서 참여한 환자의 상당수가 이미 위장관 질환을 앓고 있으며, 비스테로이드성 소염제나 아스피린을 병용투여하고 있었다. 시험자는 중등도 또는 중증의 위장관 질환을 호소하는 환자에 대하여 내시경 검사를 실시하였으며 리세드론산나트륨정5mg을 투여 받은 군과 대조군 동일할 수(각 75명, 11.9%)에 대하여 검사가 이루어졌다. 내시경검사서 식도, 위, 십이지장 점막이 정상으로 나타난 경우에는 대조군 20%, 리세드론산나트륨정5mg을 투여 받은 군 21%로서 유사하였다. 시험을 중단한 환자와 내시경 검사에서 이상 소견을 나타난 환자는 리세드론산나트륨정5mg을 투여받은 군과 대조군에서 유사하게 나타났다. 경증의 심아지장염을 나타난 환자는 리세드론산나트륨정5mg을 투여 받은 군에서 많았으나 심아지장염을 나타낸 환자의 수는 대조군에서 더 많았다. 이러한 증상을 나타내는 환자 중 임상적으로 중요한 증후(천공, 궤양, 출혈)을 나타내는 환자의 수는 두 군 간에 서로 유사하다(대조군 51%, 리세드론산나트륨정5mg을 투여한 군 39%).

- 2) 폐경기 여성을 대상으로 리세드론산나트륨정 5mg 1일 1회 투여와 리세드론산나트륨정35mg 1주 1회 투여를 비교한 1년 동안의 이중맹검, 다기관 임상시험에서, 두 투여용법의 전반적인 안전성 및 내약성 양상은 유사하게 관찰되었다. 본 임상시험 중 환자의 2% 이상에서 발현된 이상반응은 아래와 같다. 이상반응은 약물효과와 인과관계와 관계 없이 기재하였다.

1일 1회 투여와 주1회 투여를 비교한 임상시험에서 2% 이상의 환자에서 발현된 이상반응			
	전신계	리세드론산나트륨정 5mg 1일 1회 투여군 % (480명)	리세드론산나트륨정 35mg 1주 1회 투여군 % (485명)
전신계	감염	19.0	20.6
	사고로 인한 상해	10.6	10.7
	통증	7.7	9.9
	오통	9.2	8.7
	유형성감기증후군	7.1	8.5
	복통	7.3	7.6
	두통	7.3	7.2
	과각투여	6.9	6.8
	무력감	3.5	5.4
	출혈	2.3	2.7
소화기계	알레르기 반응	1.9	2.5
	종양	0.8	2.1
	목부위 통증	2.7	1.2
	심혈관계		
	고혈압	5.8	4.9
	심신	0.6	2.1
	혈관확장	2.3	1.4
	구갈		
	대사·영양관련 질환		
	말초성 부종	4.2	1.6
근골격계	관절통	11.5	14.2
	인상성 골절	5.0	6.4
	근통(근육류마티즘)	4.6	6.2
	관절염	4.8	4.1
	혈액농염	1.3	2.5
	골통증	2.9	1.4
	신경계		
	현기증	5.8	4.9
	불안감	0.6	2.7
	우울증	2.3	2.3
호흡기계	현훈	2.1	1.6
	인두염		
	기관지염	2.3	4.9
	부비강염	4.6	4.5
	인두염	4.6	2.9
	기침증가	3.1	2.5
	폐렴	0.8	2.5
	비염	2.3	2.1
	피부 및 부속기계		
	발진	3.1	4.1
특수감각계	가려움증	1.9	2.3
	백내장		
	결막염	2.9	1.9
	비호생식기계		
	요로감염	2.9	5.2

- 3) 폐경기 여성을 대상으로 리세드론산나트륨정 5mg 1일 1회 투여와 리세드론산나트륨정 150mg 월 1회 투여를 비교한 1년 동안의 이중맹검, 다기관 임상시험에서, 두 투여용법의 전반적인 안전성 및 내약성 양상은 유사하게 관찰되었다. 본 임상시험 중 환자의 2% 이상에서 발현된 이상반응은 아래와 같다. 이상반응은 약물효과와 인과관계와 관계없이 기재하였다.

1일 1회 투여와 월 1회 투여를 비교한 임상시험에서 2% 이상의 환자에서 발현된 이상반응			
	신체기관별 분류	리세드론산나트륨정 5mg 1일 1회 투여군 % (642명)	리세드론산나트륨정 150mg 월 1회 투여군 % (650명)
소화기계	상복부통	6.1	8.2
	설사	4.7	8.2
	구역	6.9	6.2
	변비	7.3	5.8
	소화불량	4.4	5.1
	구토	3.6	4.5
	복통	3.3	3.5
	위장가스	2.6	2.3
	위염	1.9	2.3
	복부팽만감	2.0	2.2
근골격계	열골통	2.3	0.8
	구강건조	2.0	0.3
	관절염		
	인플루엔자	4.2	8.9
	비인두염	6.2	5.8
	요로감염	3.6	5.7
	기관지염	4.4	3.1
	위장관염	2.2	2.8
	상기도염	1.2	2.0
	방광염	2.0	0.9
호흡기계	관절통	6.4	5.7
	관절염	7.3	5.5
	골관절염	3.0	3.7
	사지통증	2.6	2.8

근경직 근육통 경부통증	1.2 1.1 2.0	2.6 2.0 1.7
전신계 무력증	2.2	3.1
홍통	1.2	2.0
발열	0.8	2.0
넘어짐	3.3	4.6
신경계 두통 어지럼증	4.8 1.9	4.5 2.0
심혈관계 고혈압	4.8	4.6
호흡기계 기침	1.2	2.3
정신신경계 우울증	1.2	2.0
대사 및 영양이상 고콜레스테롤혈증	0.8	2.2

약을 투여한 첫 3월 이내에 발열 또는 인플루엔자 유사증상이 나타나 7일 이내로 지속되는 급성기 반응 양 증상은 리세드론산나트륨 150mg 월 1회 투여군에서 1.4%, 리세드론산나트륨 5mg 1일 1회 투여군에서는 0.2%에서 보고되었다.

리세드론산나트륨 150mg 월 1회 투여군에 리세드론산나트륨 5mg 1일 1회 투여군보다 설사로 인한 투약 중단률이 다소 높았으며 (각각 0.8%, 0.0%), 이러한 소화기계 이상반응은 대부분 투여 첫 수일 이내에 발생하였다. 구토 증상으로 인한 투약 중단은 두 군에서 동일한 수준으로 나타났다(각각 0.3%, 0.3%). 리세드론산나트륨 150mg 투여군에서 포도막염, 광각염, 황체염과 같은 눈의 염증을 경험한 환자는 없었으나, 리세드론산나트륨 5mg에서는 두 명의 환자에서 황체염이 나타났다.

실험실 검사 결과, 리세드론산나트륨 150mg 월 1회 투여군과 리세드론산나트륨 5mg 1일 1회 투여군에서 12개월 후의 혈청 칼슘은 각각 0.3%, 0.1% 증가하였고, 인산염은 2.3%씩 감소하였으며, PT/INr는 각각 4.8%, 8.3% 증가하였다. 또한 투여 후 첫 1개월이 지난 시점에서 리세드론산나트륨150mg 월 1회 투여군이 리세드론산나트륨5mg 1일 1회 투여군에서보다 저칼슘혈증 발생율이 약간 높게 나타났다(각각 2.2%, 0.2%). 이후의 저칼슘혈증의 발생율은 두 투여군에서 유사하였다 (약 2%).

4) 남성의 골다공증

285명의 남성 골다공증환자를 대상으로 한 위약대조임상시험 결과에서 골밀도는 증가시켰으나 골절 발생 빈도에는 유의한 차이가 없었다. 전반적인 안전성 및 유효성은 폐경 후 여성의 골다공증 임상시험에서 보고된 이상반응과 유사하였다. 추가로 양성전립선비대(리세드론산나트륨 35mg군 5%, 위약군 3%), 신석증(각각 3%, 0%), 부정맥(각각 2%, 0%) 이었다.

5) 리세드론산나트륨35mg 및 골레칼시페롤 5600IU 복합제 골다공증을 앓고 있는 폐경 후 여성(158명) 및 남성(6명)에서의 16주 다기관 공동, 이중맹검, 활성대조군 비교시험에서, 리세드론산나트륨35mg 및 골레칼시페롤5600IU의 복합제군은 위장관관계(12건), 근골격계(6건) 이상악물반응을 포함하여 총 18명에서 21건의 이상악물반응이 보고되었으며, 리세드론산나트륨군에서 위장관계(10건), 근골격계(62건) 이상악물반응을 포함하여 총 16명에서 24건의 이상악물반응이 보고되었, 리세드론산나트륨35mg 및 골레칼시페롤5600IU 복합제 안전성 프로파일은 리세드론산나트륨35mg에서와 유사하였다.

6) 리세드론산나트륨150mg 및 골레칼시페롤30000IU 복합제 골다공증을 앓고 있는 폐경 후 여성(158명)에서의 16주 다기관 공동, 이중맹검, 활성대조군 비교시험에서, 리세드론산나트륨150mg 및 골레칼시페롤30000IU의 복합제군은 근골격계(40건), 위장관계(32건) 등 총 34명에서 106건의 이상악물반응이 보고되었으며, 리세드론산나트륨150mg군에서 근골격계(32건), 위장관계(23건) 등 총 33명에서 82건의 이상악물반응이 보고되었다. 리세드론산나트륨150mg 및 골레칼시페롤30000IU 복합제 안전성 프로파일은 리세드론산나트륨150mg과 통계적으로 유의한 차이는 없었다.

7) 외국 시험 후 조사

스티브스-존슨증후군(피부점막안증후군), 독성 표피 괴사증후를 포함하는 중증의 피부반응, 혈관부종, 발진, 물집을 포함하는 과민반응, 피부반응 등이 매우 드물게 보고되었다. 식도염, 식도궤양 및 위궤양과 같은 상부 위장관 이상 이 보고되었다. 근골격계에서 골통증, 관절통, 근육통이 드물게 보고되었다. 황체염과 포도막염을 포함한 눈의 염증과 턱뼈괴사가 매우 드물게 보고되었다. AST(Aspartate aminotransferase), ALT(Alanine aminotransferase), 감마 GTP(gamma-glutamyl transpeptidase)의 현저한 상승을 수반하는 간기능 장애, 황달이 보고되었다(단일사례).

8) 국내 시험 후 조사(리세드론산나트륨 단일제)

국내에서 6년동안 933명을 대상으로 실시한 시험 후 사용성적조사결과, 유해사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 18.86%(176/933명, 32건)로 보고되었고, 이 중 리세드론산나트륨과 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해사례는 6.65%(62명/933명, 6건)으로 소회발량 1.71%(16명/933명, 17건), 식육부진 0.64%(6명/933명, 6건), 오신 0.64%(6명/933명, 6건), 근육통 0.54%(5명/933명, 5건), 복통 0.43%(4명/933명, 4건), 무력증 0.43%(4명/933명, 4건), 가슴쓰림 0.32%(3명/933명, 3건), 명치 통증 0.32%(3명/933명, 4건) 등의 순으로 보고되었다. 예상치 못한 약물유해사례는 1.29% (12명/933명, 12건)으로 식육부진 0.64% (6명/933명, 6건), 가슴불쾌, 두근거림, 발한 증가, 안면홍조, 작열감, 신장결석, 트림, 설노, 열이 각각 0.11% (1명/933명, 1건)이었다.

4. 일반적 주의

1) 일반사항

에스트로겐 결핍이나 노화, 글루코코르티코이드 사용 이외의 다른 골다공증 원인이 있는지도 고려해야 한다.

(리세드론산나트륨)

- 비스포스포네이트 약물은 식도염 및 식도 궤양 형성과 연관이 있다. 따라서, 환자는 상기 복용용량에 주의를 기울여야 한다. 또한 의사 및 약사는 식도 질환의 병력이 있는 환자에서 복용법의 중요성을 강조하여야 한다.
- 이 약의 투여 전에 저칼슘혈증과 여자의 뼈 및 무기질 대사 장애(예, 부갑상선 기능부전, 비타민 D 결핍증)를 반드시 치료해야 한다. 모든 환자에서 적절한 양의 칼슘과 비타민 D를 섭취하는 것이 중요하다.
- 경구용 비스포스포네이트제제 투여시 국소적 턱뼈괴사가 드물게 보고되었다. 이 증상은 일반적으로 발치 및/또는 치료가 지연된 구강감염(굴소염 포함)과 연관성이 있었다(3. 이상반응 참조). 비스포스포네이트제제와 관련된 것으로 보고된 턱뼈괴사 사례의 대부분은 정맥주사용 비스포스포네이트제제를 완한자에게 투여시 나타났다. 폐경 후 골다공증 환자에서 드 일부 발생하였다. 양, 병용투여약물(예, 화학요법, 방사선치료, 코르티코스테로이드), 불결한 구강위생, 동반질환(예, 치주질환 및/또는 기존에 있었던 치과질환, 빈혈, 옹고병증, 감염) 및 흡연이 턱뼈괴사의 위험인자로 알려져 있다. 턱뼈괴사가 나타난 환자는 구강과의사의 적절한 치료를 받아야 한다. 치과적 수술은 상황을 악화시킬 수 있다. 치과 치료를 필요로 하는 환자에 있어서, 비스포스네이트 치료의 중단이 부작용에 대한 위험을 줄일 수 있음을 보여주는 유용한 자료는 없다. 치료 조치의 임상적 판단으로 각각의 환자에 대한 관리 계획을 개별적 유익성/위험성 평가에 근거하여 세워야 한다.
- 시험 후 사용경험에서 비스포스포네이트를 투여받은 환자에서 중증이고 때때로 무기력적인 골, 관절, 및/또는 근육의 통증이 드물게 보고되었다. 비스포스포네이트 약물에는 이 약도 포함된다. 증상 발현까지의 시간은 치료 개시 후 1일부터 몇 개월까지 다양하였다. 대부분의 환자는 치료 중단 후 증상이 경감되었다. 이 환자들 중 일부에서는 동일한 또는 다른 비스포스포네이트를 재투여했을 때 증상이 재발하였다.

(골레칼시페롤)

- 비타민 D 결핍(통상, 25-hydroxyvitamin D의 수치가 9ng/mL 미만인 경우)을 치료하기 위 해 이 약을 단독으로 투여해서는 안 된다.
- 환자가 칼슘 섭취가 불충분한 경우 보충제를 복용해야 한다. 비타민 D 결핍 위험이 큰 환자(예, 70세 초과 환자, 요양소에 있는 환자, 만성 질환자)는 더 높은 용량의 비타민 D 보충제가 필요할 수 있다. 위장관 흡수장애 증후군이 있는 환자는 더 높은 용량의 비타민 D 보충제가 필요할 수 있으며 25-hydroxyvitamin D 농도 측정을 고려하여야 한다. 체중부하 운동은 흡인 및/또는 지나친 음주와 같은 특정 습관요인의 변화와 더불어 고려되어야 한다.
- 1,25 dihydroxyvitamin D가 조절되지 않고 과잉생산되는 질환(예, 백혈병, 림프종, 사르코이드증)이 있는 환자에게 비타민 D3 보충제를 투여하면 과칼슘혈증 및/또는 과칼슘뇨증이 악화될 수 있다. 이러한 환자들은 요와 혈청의 칼슘농도를 모니터링해야 한다.
- 환자에게 제공되어야 할 정보
 - 다가 약이온(칼슘, 마그네슘, 철, 알루미늄 등)을 함유한 약물, 식품, 순수한 물 이외의 음료수는 이 약의 흡수를 방해할 수 있기 때문에 동시에 투여하지 말아야 한다. 따라서 이약의 입증된 유익성을 얻기 위해서는 하루 중에 처음으로 음식물을 섭취하기 적어도 30분전 또는 음식을 섭취로부터 적어도 2시간이후 떨어진 시점에서 이 약을 투여하여야 한다.

2) 환자에게 제공되어야 할 정보

- 다가 약이온(칼슘, 마그네슘, 철, 알루미늄 등)을 함유한 약물, 식품, 순수한 물 이외의 음료수는 이 약의 흡수를 방해할 수 있기 때문에 동시에 투여하지 말아야 한다. 따라서 이약의 입증된 유익성을 얻기 위해서는 하루 중에 처음으로 음식물을 섭취하기 적어도 30분전 또는 음식을 섭취로부터 적어도 2시간이후 떨어진 시점에서 이 약을 투여하여야 한다.
- 약물을 위로 신속히 도달시켜 식도 자극의 가능성을 줄이기 위하여 환자는 반드시 이 약을 충분한 양의 물(170~230mL)과 함께 삼키고, 복용 후에는 적어도 30분간 그리고 그날의 최초 음식을 섭취 후까지 누워서는 안 된다.
- 이 약은 구강인두의 궤양화 가능성 때문에 씹거나 빨아먹어서는 안 된다. 환자는 특히 이 약을 취침전이나 기상 전에 복용하지 않도록 해야 한다. 이러한 사항을 준수하지 않았을 경우 식도장애의 위험이 증가된다는 것을 환자에게 반드시 알려져 한다. 환자에게 만약 식도질환 증상(음식물을 삼키기 어렵거나 아플 때, 흉골후방의 통증, 가슴앓이가 생기거나 심해졌을 때)이 나타나면 반드시 이 약의 복용을 중지하고 의사와 상의하도록 지시해야 한다.
- 의사는 음식물로부터의 섭취가 불충분할 경우에 보조요법으로 칼슘 및 비타민 D를 투여하는 것을 고려해야 한다. 특히, 장기적으로 전신적인 부신 피질호르몬치료(systemic corticosteroid treatment)를 받는 남녀 환자는 적절한 양의 칼슘과 비타민 D를 복용해야 한다.
- 체중부하 운동은 과도한 흡연, 음주와 같은 특정 습관 요인의 변화와 더불어 고려되어야 한다.
- 의사는 반드시 이 약 치료 전 환자에게 제품설명서를 읽도록 하고 새로운 처방을 내릴 때마다 다시 읽도록 지시해야 한다.

- 비스포스포네이트 치료를 받은 환자에서 대퇴골간부(femoral shaft)에 비정형(atypical), 저강도(low-energy) 또는 저외상(low-trauma) 골절이 보고되었다. 이러한 골절은 대퇴골소전자(lesser trochanter)에서 과상부 상면(supracondylar flare) 바로 뒷부분까지 대퇴골기 어느 부위에서든지 나타날 수 있으며, 분쇄에 대한 증거가 없는 상태에서 분절적으로 가로 또는 짧은 시선 형태로 나타난다. 비스포스포네이트 치료를 받지 않은 골다공증 환자에서 드 이러한 골절이 발생하기 때문에 인과관계는 확립되지 않았다. 비정형 대퇴골 골절은 외상이 최소한도로 있었거나 전혀 없었던 후에 가장 흔하게 나타난다. 이는 양측 모두 발생할 수 있으며, 대다수의 환자들이 완전골절(complete fracture)이 발생하기 전 수 주에서 수개월 동안 영향받은 부위에서 보통 둔하면서 아린 넓적다리 통증으로 대변되는 전구통증을 보고한다. 소수의 보고에서 골절이 나타났을 때 글루코코르티코이드 제제(예, 프레데니손) 치료를 병행하였다고 언급하고 있다. 비스포스포네이트 제제에 노출된 이력이 있는 넓적다리(high) 또는 서혜부(groin) 통증이 나타난 어떠한 환자든지 비정형 골절을 의심해야 하며, 불완전 대퇴골 골절(incomplete femur fracture)을 배제하기 위하여 평가해야 한다. 비정형 골절이 나타난 환자는 반대측 팔다리에서 골절의 증상 및 징후가 있는지 여부 또한 평가해야 한다. 환자 개별적으로 유익성/위해성 평가를 기다리는 동안 비스포스포네이트 치료의 중단을 고려해야 한다.

5. 상호작용

(리세드론산나트륨)

- 이 약은 별도의 약물 상호작용 연구는 수행되지 않았다. 폐경 후 골다공증 치료를 위한 제3상 임상 시험에 참여한 여성의 31%가 아스피린을, 48%가 비스테로이드성 소염진통제를, 21%가 H2 길항제 및/또는 프로톤펌프 억제제를 복용했다. 일주일에 3일 이상 정기적으로 아스피린 또는 비스테로이드성 소염진통제를 복용한 환자들에서 나타난 상부 위장관 이상반응 발현은 시점군과 대조군에서 비슷했고, H2 길항제 및/또는 프로톤펌프 억제제를 복용한 환자들에서도 유사한 결과와 관찰되었다.
- 필요하다면 호르몬 대체 요법과 병용할 수 있다.
- 칼슘소금, 제산제 및 다가 약이온(칼슘, 마그네슘, 철, 알루미늄 등)을 함유한 경우투여 약물의 병용 투여는 이 약의 흡수를 방해한다.
- 이 약은 전신적으로 대사되지 않으며, 사이토크롬 P-450호소를 유도하거나 억제하지 않는다. 인체 혈장내 단백 결합률은 약 24%이며, 동물 실험 결과 약 60%가 뼈에 분포하였다. 나머지는 대사되지 않은 상태로 신장 배설된다.

(골레칼시페롤)

- 골레칼시페롤 흡수를 저해할 수 있는 약물
알레스트라(Olesra), 광물성 기름, 오르리스타트(orlistat), 담즙산 제거약(예, 콜레스타티란, 콜레스티폴론)은 비타민 D의 흡수를 저해할 수 있다. 비타민 D의 추가적인 보충을 고려하여야 한다.
- 골레칼시페롤의 이화작용(catabolism)을 증진시킬 수 있는 약물
항경련제, 시메티딘, 치아자이드는 비타민 D의 이화작용을 증진시킬 수 있다. 비타민 D의 추가적인 보충을 고려하여야 한다.

6. 일부와 수유부에 대한 투여

(리세드론산나트륨)

- 일부에 대한 연구는 없었으나, 동물시험에서 분만이 모체 저칼슘혈증과 태자의 골화 속도가 일어날 수 있음이 보고되었다.
- 이 약이 수유부에 미치는 중요성을 고려하여 이 약의 투여를 중지하거나 수유를 중단하여야 한다.
- 랫트에 이 약 16mg/kg/day(체표면적당 용량(mg/m²))으로 환산시 인체 투여 용량인 30mg/day의 약 5.2배) 이상을 임신기간 동안 투여하였을 때 생존출산자수가 감소하였고, 출골분량의 비골화 및 불완전 골화가 증가하였다. 또한 80mg/kg/day로 투여하였을 때 출산사 체중이 감소하였으며, 7.1mg/kg/day로 투여한 경우에는 출골분질 및 두개골의 불완전 골화가 나타났다. 태자의 수가 통계적으로 유의하게 증가하였다. 3.2mg/kg/day 이상으로 투여하여 분만한 태자에서, 낮은 발생률로 구개열이 관찰되었다. 도끼에게 임신기간 동안 10mg/kg/day까지 투여하였을 때 유의한 태자의 골화호과는 발생되지 않았으나, 10mg/kg/day에서 140리간 새끼 중 1마리는 유산되었고, 1마리는 조산되었다. 다른 비스포스포네이트 제제와 유사하게, 랫트에 이 3.2mg/kg/day 동안 투여용량의 1배로 골배기간 및 임신기간 동안 투여한 경우 모체의 분만전후 저칼슘혈증 및 사망이 관찰되었다. 이 약물은 약물투여 후 24시간 이내에 수유중인 랫트에서 검출되며 유즙을 통해 분비된다.

(골레칼시페롤)

- 골레칼시페롤(비타민 D₂)에 대한 자료는 없다. 에르고칼시페롤(비타민 D₂)을 임신한 도끼에 고용량으로(이틀에 한번 10,000 IU 이상) 투여한 결과, 유산율과 태자의 대동맥 협착증 발생율이 증가하였다. 비타민 D₂를 임신한 랫트에 일일 40,000 IU를 투여한 결과 신생아 사망, 태자 체중 감소, 출생 후 장골의 골형성 손상이 나타났다.
- 골레칼시페롤과 이 활성대사체는 모유로 이행된다.

7. 소아에 대한 투여

소아에서의 안전성과 유효성은 확립되지 않았다.

8. 고령자에 대한 투여

고령자와 젊은 환자 사이에 안전성과 유효성은 차이가 없다.

9. 과량 투여시의 처치

(리세드론산나트륨)

- 일부 환자에서서 상당량의 과량 투여로 인한 혈청 칼슘과 인의 감소를 예상할 수 있다. 이러한 환자에서서 저칼슘혈증의 징후와 증상이 나타날 수 있다. 이 약의 흡수를 감소시키기 위해서는 우유나 칼슘을 함유하는 제산제를 투여하여야 한다.
- 상당량이 과량 투여한 경우 흡수되지 않은 약물을 제거하기 위해 위세척을 고려해야 한다. 저칼슘혈증을 효과적으로 치료하기 위한 효과적인 표준화된 방법들은 이온화 칼슘의 생리학적인 양을 회복시켜주고 저칼슘혈증의 징후와 증상을 감소시킨다.

(골레칼시페롤)

- 골레칼시페롤의 호르몬성 대사체인 칼시트리올을 마우스에게 고용량으로(1mg/kg) 단회 경구투여한 결과 치사율이 유의하게 나타났다.
- 에르고칼시페롤 (비타민 D₂) 600,000 IU를 간헐적으로 (연 1회 내지 2회) 단회 투여하였을 때 독성에 대한 보고는 없었으나 급성 독성과 관련한 골레칼시페롤의 용량 정보는 제한적이다. 비타민 D 독성과 관련한 징후와 증상에는 고칼슘혈증, 고칼슘뇨증, 식육부진, 구역, 구토, 다뇨증, 다음증(polydipsia), 쇠약, 기면 등이 있다. 비타민 D 독성이 의심되는 환자는 혈청과 소변의 칼슘 수치를 모니터링하여야 한다. 중증 고칼슘혈증 환자의 표준치료법으로는 식이 내 칼슘섭취 제한, 수분 공급, 전신 글루코코르티코이드 투여 요법 등이 있다. 비타민 D를 제거하기 위한 투석은 효과적이지 않다.

10. 기타

- 발달상, 변이원성, 생식독성

(골레칼시페롤)

- 설치류에서 골레칼시페롤(비타민 D₂)의 발암성 연구는 수행되지 않았다. 골레칼시페롤의 호르몬성 대사체인 칼시트리올은 Ames 미생물 돌연변이 분석(대사활성이 존재할 경우와 존재하지 않을 경우)과 마우스 체내 소핵 시험에서 유전독성이 없었다.
- 교미전 에르고칼시페롤(비타민 D₂)을 고용량으로(150,000에서 200,000 IU/kg/day) 랫트에 투여한 결과 발정주기가 변화되고 임신이 억제되었다. 수컷 랫트의 수태능에 대한 골레칼시페롤의 잠재적 영향은 알려져 바 없다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의 할 것.

【저장 방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장 단위】 1정

【소비자 상담 항목】

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 이메일을 주십시오.
TEL : (02) 3489-8114 홈페이지 : http://www.hanlim.com

【반문 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2012. 09. 04)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.	
---------------------------	--

제조 · 판매원 한림제약주식회사 공정·경기도 웅진시 천안시 영문로 2-27(유방동) http://www.hanlim.com

설명서 작성년월일 : '12. 05. 26 설명서 개정년월일 : '12. 09. 04 제품의 사용기한은 외부용기에 표기	
P32471-02	