

말초혈행장애 및 갱년기 증상의 완화

셀비콤연질캡슐

■성분·함량 : 1캡슐 중	
셀레늄함유건조효모(별규) (셀레늄으로서 50μg)	38,462mg
아스코르브산(KP)	500.00mg
토코페롤아세테이트(KP) (비타민E로서 300 IU)	300.00mg
리보플라빈(KP)	10.00mg
피리독신염산염(KP)	7.30mg
시아노코발라민1000배산(KP) (시아노코발라민으로서 1.8μg)	1.80mg
니코틴아미드(KP)	20.00mg
티아민질산염(KP)	12.34mg

■성상

황색의 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

■효능·효과

- 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, E 의 보급
- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 티아민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목걸림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨통증) 등), 각기, 눈의 피로, 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방

■용법·용량

12세 이상 및 성인 1일 3회, 1회 1캡슐 복용

■사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 12개월 미만의 정맥이(갓난아기)
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
 - 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 신장장애 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
: 위부(상복부)불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 피부염, 맥·호흡시 약취, 탈모, 조급증
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 티아민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 콜린이 부족한 환자에게 티아민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애, 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 항알도스테로네제, 트리암테렌과 병용투여(함께 복용)시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 각종 요염사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■사용기간 : 제조일로부터 24개월

■포장단위 : 자사포장단위

■제조회사 : (주)테라젠이텍스 / 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58 (초지동)

■제조사 : (주)알피코프 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7



생명과학 연구중심 제약기업

테라젠이텍스

경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58

- ※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서(설명서)를 주의 깊게 읽어야 하며, 이 첨부문서(설명서)를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- ※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- ※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-71110이나 www.etexpfarm.com 에서 확인 할 수 있습니다.