

알마딘정



Pimex Management Group

일반의약품 분류번호 : 234

알마딘정은 H₂ 수용체 길항제와 3종의 제산제 복합제로서 신속하고 강력한 위산분비 중화과 억제제를 통해 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역의 증상을 효과적으로 완화시킵니다.

【 성분·함량 】 1정 중

라니티딘염산염(USP)	31.5mg
(라니티딘으로서 28, 227mg)	
규산알루미늄산마그네슘(NF)	125mg
산화마그네슘(KP)	50mg
수산화알루미늄산마그네슘(KPC)	100mg

【 성 상 】 노란색의 원형 필름코팅 정제

【 효능·효과 】 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

【 용법·용량 】

성인(15세 이상, 80세 미만) : 1회 2정씩 복용하되 복용 후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용 하십시오. 단, 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 하십시오.

【 사용상의 주의사항 】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 다음 질환으로 치료 받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장·간장질환, 위·십이지장질환, 천식·류마티스 등의 면역계질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있다.)
- 2) 다음 약물을 투여 받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아줄제 항진균제(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있다.)
- 3) 적혈구 감소증, 혈소판 감소증, 백혈구 감소증 등의 혈액액 이상의 병력이

있는 환자(혈구수의 감소가 증가될 수 있다.)

- 4) 히스타민 H₂-수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 사람
- 5) 소아(15세 미만) 및 고령자(80세 이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적다.) 80세 이상의 고령자에게는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져서 약효가 강하게 발현될 수 있다.
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의한다.
- 7) 투석요법을 받고 있는 환자
- 8) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약제를 복용중인 환자 : 약물 상호작용에 의해 부작용의 발현 및 효과의 감소가 나타날 수 있다.
- 2) 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람
- 3) 고령자(65세 이상) : 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여한다.
- 4) 인후통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구 감소 등의 혈액 이상이 인정될 수 있다. 이러한 증상은 본제의 복용에 의해 증상이 악화되거나 본제의 부작용을 은폐시킬 수 있다.
- 5) 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.
- 6) 복통이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.

3. 부작용

본제의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현될 수 있다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의할 것

- 1) 알레르기증상(발진, 발적, 가려움, 부종), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(염산라니티딘의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중독한 부작용을 일으키는 경우가 있다.)
- 2) 본제의 복용 후 즉시 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워지며, 식은땀, 숨막힘 등이 나타나는 경우
- 3) 고열을 동반한 발진, 발적, 열에 의한 물집 등 심한 증상이 전신피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우

- 4) 목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈꺼풀의 안쪽이 하얗게 변함, 출혈
하기 쉽게 됨(치경의 출혈, 비출혈 등)이 나타나는 경우
- 5) 황달

4. 일반적인 주의

- 1) 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것
- 2) 2주간을 초과하여 연용하지 말 것(장기 연용을 하지 않는다.)
- 3) 본제를 복용할 시에는 알콜음료는 섭취하지 말 것(혈중 알콜농도를 높일 수 있음)
- 4) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것
- 5) 기재된 효능 이외의 증상에는 복용하지 말 것
- 6) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용 전에 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 상호작용

- 1) 본제에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있다.
 - 데트라사이클린계 항생물질(데트라사이클린 등)
 - new-퀴놀론계 항균제(오플록사신 등)
- 2) 이 약을 다른 위장약과 병용하지 말 것
다른 위장약을 동시에 병용하면 작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있다.

6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여한 경우에는 수유하지 않도록 주의한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다. (사용경험이 적다.)

8. 고령자에 대한 투여(65세 이상)

80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여 한다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선이나 고온인 장소를 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정, 300정

KGMP 적격업소 제품

[제조자] (주)한국피엠지제약 / 경기 시흥시 경제로 59

※ 이 첨부문서 작성일자(2012. 05. 01) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전청 의약품 전자민원창구 (<http://ezdrug.kfda.go.kr/>)의 '의약품정보'란을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 병·의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하시기 바랍니다.

※ 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

 **한국피엠지제약**
Pionex Management Group

PMG PHARM
Pionex Management Group