

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 약과 함께 보관하십시오.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

유효성분: 구아이페네신(KP)40.00mg, d-메틸에페드린염산염(KP)12.50mg, 액스트로메토르판브로화소산염수화물(KP)8.00mg, 아세트아미노펜(KP)200.00mg, 기타 첨가제: 소르비톨스페실글리세린비렌드, 정제수, 젤라틴, 치자청색소, 모비돈, 폴리메탈글리콜400, 프로판렌글리콜

【성상】 무색 내지 연한 청색의 내용물을 함유한 청색의 투명한 타원형 연질캡슐

【효능·효과】 감기의 증상(여러 증상)인후(목구멍), 기침, 가래, 오한(열)을 완화하는 증상, 발열, 두통, 관절통, 근육통의 완화

【용법·용량】

- 만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용
- 만 11세 이상-만 15세 미만: 1일 3회, 1회 1½캡슐 식후 30분에 복용
- 만 7세 초과-만 11세 미만: 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있습니다. 2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부 반응은 치명적일 수 있습니다. 따라서 이러한 중대한 피부 반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 합니다. 3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있습니다. 아세트아미노펜으로 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아 (갓난아기)
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

진해기침을 그치게 함(가래제거제), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 알미약, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의하십시오.)
- 2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우로 만 2세 미만의 영아(갓난아기), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 합니다. 만 2세 미만 영아(갓난아기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지 천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람 (당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(홍혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 어지러움, 불안, 알림, 불면
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한증상) 증상이 나타난 경우
① 속(아나필락시스): 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
② 피부점막만종후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증(리얼증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(홍혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있습니다.
③ 천식
④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있습니다.
⑤ 간질성폐렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타납니다.
- 3) 5-6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도감독 하에 복용시키십시오.
- 4) 복용시에는 음주하지 마십시오.
- 5) 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 물 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오물(질분 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【주의】

- 1) 개봉 후에는 타제품과의 혼입 및 혼용(섞어 쓸)이 되지 않도록 주의하십시오.
- 2) 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
- 3) 제품 개봉시 또는 취급시 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
- 4) 이 약은 제제의 특성상 온도변화에 민감하므로 항상 서늘한 곳에 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

연질캡슐이 녹거나 변형될 수 있으므로 직사광선 및 고온 다습한 곳을 피하여 보관하시기 바랍니다.

【포장단위】 10캡슐



강하게 누르십시오.

구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품 (주 = 등록상표) K9

제조업체:



본사: 서울특별시 서대문구 홍성로 8 (홍성로 3가)
공장: 충남 천안시 서북구 성거읍 당항로 731-46
구입처문의 및 소비자상담실: 080-6776-080(수신자 부담)
제품상세정보: www.okdpharm.com 참조



제 조 자: (주)알파바이오 공장: 경기도 화성시 향남읍 차악공단 4길 35-7

소 비 자 중 심 경 영

공정거래위원회 | 한국소비자원

※ 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국약물안전관리센터(1644-6223)에 부작용 피하구제 신청을 할 수 있습니다.
이 첨부문서 작성일자(2020.05.01)이후 변경된 내용은 종근당 인터넷 홈페이지(www.okdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.