

엽산보충제 피엠지폴산정

Folic acid



일반의약품 | 분류번호 : 313

폴산은 체내 적혈구 생성에 필요한 purine 및 pyrimidine의 합성 등 여러 대사 효소에 관여하여 적혈구 생성을 도와줍니다. 피엠지폴산정은 폴산결핍성빈혈 뿐만 아니라 알콜중독 및 간질환에 의한 거대적아구성빈혈 등의 치료에 사용되는 조혈비타민제입니다.

【 성분·함량 】 1정 중

폴산(USP) 1mg

첨가제(타르색소) : 황색4호

【 성 상 】 연한 노란색의 원형 정제

【 효능·효과 】

1. 폴산결핍증의 예방 및 치료
2. 폴산의 수요가 증대하여 식사로부터 섭취가 불충분한 경우의 보충 : 소모성 질환, 임부·수유부
3. 악성빈혈의 보조요법(비타민B₁₂ 결핍으로 인한 빈혈 제외)
4. 다음 질환 중 폴산의 결핍 또는 대사장애가 관련한다고 추정되는 경우
 - 1) 영양결핍성빈혈, 임신성빈혈, 소아빈혈
 - 2) 항전간제, 항말라리아제 투여로 인한 빈혈
5. 알콜중독 및 간질환에 관련된 거대적아구성빈혈

【 용법·용량 】

1. 폴산결핍증, 다른 약물 투여로 인한 결핍증 치료
성인 및 어린이 : 폴산으로서 1일 0.25~1mg를 복용한다.
2. 폴산결핍증 예방 및 폴산의 요구량이 증대하는 각종 질환
성인 및 어린이 : 이 약으로서 1일 0.1~0.25mg를 복용한다.

【 사용상의 주의사항 】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 또는 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자
 - 2) 비타민B₁₂ 결핍으로 인한 악성빈혈 또는 거대적아구성빈혈
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 악성빈혈 환자투여 시, 혈액상태는 개선되나 신경증상에는 효과가 없으므로 비타민B₁₂ 제제를 병용할 것. 단, 진

단 이 확립되지 않는 악성빈혈 환자의 경우 혈액상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하여 진단 및 치료에 영향을 줄 수 있으므로 주의할 것)

- 3) 아마노살리실산, 경구용 피임제, 디하이드로폴레이트 환원효소 저해제(메토틱세이트, 트리메토프림 등)를 복용 중인 환자(바람직하지 않는 상호작용을 초래할 수 있다.)
- 4) 페니토인 같은 히단토인에 항전간제를 복용 중인 환자(페니토인의 혈중농도를 감소시켜 발작빈도를 증가시킬 수 있다.)
- 5) 설피살라진, 콜레스티라민을 복용 중인 환자(이 약의 위장관 흡수를 저해할 수 있다.)
- 6) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 홍반, 피부발진, 가려움증, 전신권태, 호흡곤란 등의 알레르기 증상
- 2) 식욕부진, 구역·구토, 부종, 체중감소
- 3) 위장관장애, 수면변화, 집중부족, 과잉행동, 과민성, 흥분, 우울증, 혼란, 판단력장애 등의 중추신경장애(고용량(1일 15mg 이상)에서 나타날 수 있다.)

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 어린이에게 투여할 경우 보호자의 지도·감독 하에 투여할 것
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)

[포장단위] 180정, 1000정

KGMP 적격업소 제품

[제조자] (주)한국피엠지제약 / 경기 시흥시 경제로 59

- ※ 이 첨부문서 작성일자(2012.05.18) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전청 의약품 전자민원창구 (<http://ezdrug.kda.go.kr>)의 '의약품등 정보'란을 통하여 확인하실 수 있습니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 병·의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다.
- ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하시기 바랍니다.
- ※ 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.