

일반의약품

인코라민[®] 스페셜정

고함량 비타민

육체피로, 눈의피로, 구내염, 근육통, 신경통, 어깨결림
비타민B 12중, 비타민C, 비타민D, 아연, 마그네슘

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.

- **인코라민 스페셜정**은 육체피로와 관절통(요통, 건통), 입안내 구내염 증상에
비타민 B₁, B₂, B₆를 보충하고, 뼈, 이의 발육불량에 필요한 칼슘을 보강한 제품
입니다.
- **작장인, 갱년기 여성, 수험생을 위한 고함량 비타민 - 인코라민 스페셜정**
- 빠른 피로회복 및 관절통(요통, 건통) 완화를 위한 비타민B₁(벤포티아민) 함유
- 뼈, 이의 발육불량 개선을 위한 비타민D(콜레칼시페롤) 함유
- 갱년기 여성을 위한 감마오리자놀 성분 함유
- 1일 1회 복용으로 복용편리



육체피로 · 어깨결림



구내염



갱년기 증상

【원료약품의 분량】 이 약 1240mg 중

벤포티아민(KPC).....	50mg
(티아민염산염으로서 36.15mg)	
리보플라빈(KP).....	50mg
니코틴아미드(KP).....	50mg
판토텐산칼슘(KP).....	30mg
(칼슘으로서 2.52mg)	
피리독신염산염(KP).....	50mg
0.1% 시아노코발라민(KPC).....	50mg
(시아노코발라민으로서 50μg)	
중주석산콜린(DAB).....	50mg
아노시톨(KP).....	50mg
α-비오틴(EP).....	0.2mg
폴산(KP).....	0.4mg

산화아연(KP).....	21.2mg
(아연으로서 17.03mg)	
제피아스코르빈산(KPC).....	104.17mg
(아스코르빈산으로서 101.05mg)	
셀레늄함유건조효모(KPC).....	17mg
(셀레늄으로서 22.1μg)	
콜레칼시페롤과립(KPC).....	4mg
(비타민D로서 400IU)	
산화마그네슘(JP).....	100mg
(마그네슘으로서 60.3mg)	
무수인산수소칼슘(KP).....	100mg
(총 칼슘으로서 31.93mg)	
(칼슘으로서 29.41mg)	
감마오리자놀(KPC).....	5mg
DL-메티오닌(KP).....	50mg
참기재(식약청 인정 타르색소) : 타르트라진 알루미늄레이크, 선셋옐로우 FCF 알루미늄레이크(황색5호)	

【성상】

주황색의 장방형 필름코팅정

【효능 · 효과】

- 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆, C의 보급
 - 육체피로
 - 임신 · 수유기
 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 발육기
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
 - 비타민D(콜레칼시페롤)
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방
 - 비타민B₁(벤포티아민)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 건통(어깨결림) 등)
 - 각기
 - 눈의피로
 - 비타민B₂(리보플라빈), 비타민B₆(피리독신염산염)
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

2. 아연의 보급

【용법 · 용량】

만 12세 이상 및 성인 : 1회 1정씩 1일 1회 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)
환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신결석 환자
 - 5) 심한증상의 신부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 감심배당체를 투여 중인 환자
- 9) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 10) 신장결석 병력이 있는 환자
- 11) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음과 같은 증상이 있을 경우
: 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관 장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 3) 피라독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 7) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
- 8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 9) 우발적으로 과량복용한 경우
- 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있습니다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[주의]

- ① 개봉 후에는 타제품과의 혼입 및 혼용(섞어섞임)이 되지 않도록 주의하십시오.
- ② 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
- ③ 제품 개봉시 또는 취급시 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

[포장단위]

60정, 120정

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[사용기간]

제조일로부터 36개월

약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관해야 합니다.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

KGMP(우수약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

㉔=등록상표

101

제조의뢰자 :



중근당

본사: 서울특별시 서대문구 충정로 37가 368
공장: 충남 천안시 서북구 성거읍 오색당리 15-20
구입처문의및 소비자상담실: 080-6776-080(수신자 부담)
제품상세정보: www.ckdpharm.com 참조

제 조 원 : 한국콜마(주)
충남 연기군 신정리 618-3

이 첨부문서 작성일자(2012. 5. 1) 이후 변경된 내용은
중근당 인터넷 홈페이지(www.ckdpharm.com)나
소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.