

(이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 제품과 함께 보관하십시오)

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1mL 중	
염화나트륨(KP) (총나트륨으로서 2.2364mg/총염소로서 4.0496mg)	5.5mg
염화칼륨(KP) (총칼륨으로서 0.7867mg)	1.5mg
보존제 : 클로르헥시딘글루콘산염액 20%(BP) (클로르헥시딘글루콘산으로서 0.05mg)	0.25μl
완충제 : 붕산(KP)	5mg
완충제 : 붕사(KP)	0.5mg
점조제 : 히드록시에틸셀룰로오스(NF)	0.25mg
안정제 : 에데트산나트륨수화물(KP)	0.1mg
흡착방지제 : 폴리소르베이트80(KP)	1.5mg
용제 : 주사용수(KP)	적량

[성상] 무색 투명한 용기에 든 무색 투명한 액

[효능·효과]

눈의 피로, 누액(눈물)의 보조(눈의 건조), 하드콘택트렌즈 또는 소프트렌즈 착용 시 불쾌감, 눈의 침침함. (눈곱이 많을 때 등)

[용법·용량] 1회 2~3방울, 1일 5~6회 점안(눈에 넣음)한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 눈의 통증이 심한 사람

2) 지금까지 안(눈)약에 의한 알레르기 증상(예를 들어 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기), 발진, 충혈되어 붉어짐 등)을 일으킨 적이 있는 사람

3) 녹내장 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 경우

2) 하드콘택트렌즈를 착용하는 사람에게서 눈곱 등의 분비물이 많으면서 드물게 렌즈가 흐리게 되는 경우

3) 이 약 투여에 의해 눈의 침침함이 개선되지 않는 경우

4) 2주 정도 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않는 경우
3. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 이 약은 점안(눈에 넣음)용으로만 사용할 것.

3) 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 곰팡이 등에 의해 약액이 오염 또는 혼탁(흐림)될 수 있으므로 주의할 것.
또한 혼탁(흐림)된 것은 사용하지 말 것.

4) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 말 것.
4. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 10mL, 14mL

[저장방법 및 사용(유효)기간] 기밀용기, 차광하여 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 제품은 우수의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 파손되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

※ 본 제품 첨부문서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용이나 제품정보 또는 제품문의는 전화 043)881-6333를 통해 확인할 수 있습니다.