

위스날 정



WISNAL Tablets.

문명의 발달에 따라 질병의 발생도 다양화되고 만성화되는 경향이 두드러지고 있습니다.

특히 식생활의 고급화와 다양화로 인한 과음, 과식은 소화불량의 원인이 되고 소화불량은 영양섭취의 불균형과 질병발생의 원인이 되고 있습니다.

위스날정은 소화제의 기본조건인 “신속하고” “자율적 소화능력의 확실한 보조” 등 2중효과를 충분히 발휘할 수 있게 처방된 고단위 소화효소제입니다.

특징

위스날정은 위내 소화효소군의 소화력을 보조하여 단백질 탄수화물 등 음식물의 소화를 확실하게 도와줍니다.

위스날정은 위산을 적절히 중화하여 위산과다에 의한 소화불량을 개선합니다.

위스날정은 소화작용과 식욕증진작용의 2중효과가 있습니다.

【원료약품의 분량】 1정중

디아스타제 프로테아제(KP)	10mg
α-아밀라제(전분 호정화 효소)	1,000단위
β-아밀라제(전분 당화 효소)	120단위
프로테아제(단백질 분해 효소)	320단위

탄산수소나트륨(KP) 125mg

메타규산알루미늄산마그네슘(KP) 50mg

· 첨가제(동물유래): 유당수화물(기원: 소, 사용부위: 우유)

【성상】 백색 원형의 필름코팅정

【효능·효과】

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체한, 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량,

식욕 감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】

성인 1회 2~4정 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose -galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 2) 투석요법을 받고 있는 환자
- 3) 만 7세 이하의 어린이

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 신장장애 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 4) 인산염 저하가 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우)이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
- 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 설명서개정년월 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

설명서개정년월 : 2015년 01월

제품문의 (032) 812-8356



제조발매원

영풍제약주식회사

인천광역시 남동구 월곶로 333



본 의약품은 정부의 KGMP
(우수외약품 관리기준)에
의거하여 엄격한 관리에
의해 생산된 제품입니다.