

고함량 비타민D 단일제

애드민 포르테 정

(콜레칼시페롤과립)



일반의약품

분류번호 : 311

햇빛을 통해 체내에서 합성되는 비타민D는 장으로부터 칼슘과 인의 흡수를 도움으로써 칼슘의 항상성을 유지시키고, 골세포에 직접 작용함으로써 뼈의 무기질화를 돕습니다. 비타민D 1,000IU를 함유하는 애드민포르테정은 햇빛 노출이 적은 현대인들의 골 건강을 위한 제품입니다.

[성분·함량] 1정 중

콜레칼시페롤과립(KPC) 10mg
(비타민D₃로서 1,000IU)

[성 상] 흰색 내지 흰노랑의 마름모형 정제

[효능·효과]

1. 골다공증 치료 보조
2. 흡수장애가 없는 건강한 사람에서 비타민D 결핍 질환 위험으로부터의 예방
3. 구루병의 예방

[용법·용량]

1. 골다공증 치료 보조 : 1회 1정(1,000IU)씩 1일 1회
2. 흡수장애가 없는 건강한 사람에서 비타민D 결핍 질환 위험으로부터의 예방 : 1회 1/2정(500IU)씩 1일 1회
3. 구루병 예방 : 1회 1/2정(500IU)씩 1일 1회
 - 성인 : 충분한 양의 물과 함께 복용한다.
 - 정제를 삼키기 어려운 유아 : 숟가락에 정제를 놓고 물에 봉해시킨 후 가능한 식사와 함께 복용한다. 음식에 넣을 때는 음식을 끓인 이후 넣어주고, 비타민D가 많은 식품인 경우 용량조절이 필요할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 과칼슘혈증 환자
 - 2) 과칼슘뇨증 환자

- 3) 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
- 4) 신장결석 환자
- 5) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 6) 3개월 미만의 영아

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 벤조티아디아진 유도체 : 과칼슘혈증 위험 증가

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 1세 미만의 영아
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피한다.
- 4) 신장결석의 이력이 있는 환자
- 5) 유육종증 환자
- 6) 움직임이 제한적인 환자(척고집스)
- 7) 벤조티아디아진 유도체를 투여한 환자
- 8) 거짓부갑상선기능저하증 환자
- 9) 임부 : 과다 복용시 기형유발의 위험이 있다.(신체적 및 지적 발달 지연, 대동맥협착의 특이한 형태)
- 10) 수유부 : 비타민D와 대사체는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다
 - 1) 신장대 환자
 - 2) 다른 비타민D 제제를 복용하는 경우(용량이 조절되어 아 함)
 - 3) 페니토인 또는 바비탈류 약물 복용 환자
 - 4) 치아징제 이노제 복용 환자
 - 5) 글루코코르티코이드 복용 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 신경정신계 : 정신적 증상, 의식장애(혈청 칼슘 증가), 두통
- 2) 위장관 : 구역, 구토, 식욕부진, 체중감소, 갈증증가(혈청 칼슘 증가)
- 3) 전해질
 - 혈청 칼슘 증가에 따른 급성 증상 : 부정맥, 구역, 구토, 정신적 증상, 의식장애
 - 혈청 칼슘 증가에 따른 만성 증상 : 증가된 배뇨감, 갈증증가, 식욕부진, 체중감소, 신장결석, 신장석회화, 뼈의 외곽 조직에서의 석회화, 개별 증례에 있어서 치명적 진행(과다 복용시)
- 4) 심장 : 부정맥(혈청 칼슘 증가)
- 5) 비뇨기계 : 증가된 배뇨감, 신장결석, 신장석회화(혈청 칼슘 증가)
- 6) 기타 : 뼈의 외곽 조직에서의 석회화(혈청 칼슘 증가), 근육통 및 관절통

5. 일반적인 주의

- 1) 일일 500IU 이상을 투여하는 경우 혈액 및 뇨중 칼슘 수치와 신장기능을 주기적으로 모니터링하여야 한다. 모니터링 결과 필요하다면 용량을 조절해야 한다.
- 2) 이 약을 삼키기 어려운 유아는 정제를 물에 녹인 다음 복용한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 오남용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.
- 3) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정, 300정

KGMP 적격업소 제품

[제조자] (주)한국피엠지제약 / 경기 시흥시 경제로 59

※ 이 첨부문서 작성일자(2012.06.04) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전청 의약품 전자민원창구(<http://ezdrug.kda.go.kr>)의 '의약품등 정보'란을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 병·의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하시기 바랍니다.

※ 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

 **한국피엠지제약**
Pionex Management Group

PMG PHARM
Pionex Management Group