

조 제 용
일 반 의 약 품
분류번호:321

디카테오^정

고함량 비타민D + 시트르산칼슘

K G M P
적 격 역 체

디카테오정은 비타민D와 칼슘의 보급을 위하여 비타민D(콜레칼시페롤) 1000IU와 시트르산칼슘 1500mg(칼슘으로서 316mg)을 복용하도록 설계된 복합 의약품입니다.

- [원료약품의 분량] 1정 중
- 유효성분: 농축콜레칼시페롤 과립(EP).....10mg
[비타민D로서 1000IU, (동물유래성분: 양의 털, 소의 가죽)]
시트르산칼슘(USP).....1500mg
(칼슘으로서 316mg)
 - 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 포비돈

[성 상] 흰색의 장방형 정제

- [효능·효과]
- 다음 경우의 비타민 D의 보급
 - 임신·수유기, 발육기, 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방
 - 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급

- [용법·용량]
- 성인 및 만 8세 이상 어린이: 1일 1회 1정을 복용
- ※ 디카테오정은 가운데 분할선이 있어 분할하여 복용하기 편리합니다.

- [사용상의 주의사항]
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 신장결석 환자
 - 심한 증상의 신부전 환자
 - 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 만 1세 미만의 젖먹이
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
 - 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 신장장애 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 강심배당체를 투여 중인 환자
 - 신장결석 병력이 있는 환자
 - 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 열골달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 유헤심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
 - 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오.
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

- [저장방법] 30정, 90정
- [포장단위] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
- [최종개정연월일] 2023.07.26
- [제조원] (주)다림바이오텍 강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 33 A동1~3층,B동1층, S동

- ※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 생산된 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 이 첨부문서의 최종개정연월일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해 구제를 신청할 수 있습니다.

dalim(주)다림바이오텍

ver.03

(주)다림바이오텍 강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 33 A동1~3층, B동1층, S동
대표전화: 02) 335-1656 / 소비자상담실: 080) 333-1656(수신자부담)
공장 및 연구소: 033) 738-4600 / 한국의약품안전관리원: 1644-6223, 14-3330