

일반의약품

분류번호

치과구강용약
(231)

블루케어

스프레이(수용성아줄렌)

“목의 통증·구내염(입안염)으로 불쾌감이 있으신가요?”

원료약품의 분량 (100mL 중)

수용성아줄렌(KP).....	0.02g
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	0.07g
파라옥시벤조산프로필(KP)	0.03g

성상 특이하고 향긋한 냄새와 청량감이 있는 청자색~청색의 용액

효능·효과 목(인후)의 염증으로 인한 목의 통증, 목의 부종(부기), 목의 불쾌감, 목이 썸, 구내염(입안염)

용법·용량 1일 수회(여러차례) 적당량을 환부(질환부위)에 분사 도포(바름)합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽고 사용하시기 바랍니다.

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 2) 구강(입안)내 짓무름이 심한 사람
 - 3) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 4) 약물에 대하여 알레르기 병력이 있는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고, 의사, 치과의사 및 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 사용 후 다음 증상이 있는 경우 : 입에 자극감, 피부에 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움
 - 2) 증상이 악화되는 경우
 - 3) 5~6일을 사용하였으나 증상의 개선이 없는 경우
- 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
 - 1) 정하여진 용법·용량을 지켜서 사용하십시오.

2) 호흡을 들이실 때 이 약을 사용하면 약액이 기관지 또는 폐로 들어갈 수 있으므로, 용기 노즐을 목의 환부(질환부위)를 향하게 하고 '아' 하고 목소리를 내면서 분사합니다.

3) 목(인후)의 도포(바름)용으로 사용하고, 내복하지 않습니다.

4) 소아가 사용하는 경우에는 보호자의 지도감독 아래 사용하십시오.

5) 약액이 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만일 눈에 들어간 경우 즉시 물로 잘 씻고, 바로 안과전문의를에게 진료를 받으십시오.

6) 이 약을 사용하고 일정시간 내에는 음주운전 판정 농도 이상의 알코올이 호흡으로 검출될 수 있으므로, 운전 중의 사용은 피합니다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 서늘한 장소에 보관하십시오.
- 2) 소아의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)의 원인이 되거나 품질의 변화가 있을 수 있으므로 다른 용기에 바꾸어 넣어 사용하지 마십시오.
- 4) 약액이 의류 등에 묻은 경우에는 즉시 물 또는 세제로 씻으십시오.
- 5) 사용시 약액의 분출이 달라질 수 있으므로 용기 노즐의 입구 부분을 바늘 등으로 뚫지 마십시오.
- 6) 화기와 가깝게 두지 마십시오.
- 7) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 30mL

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2015년 1월 6일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.iildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조사 : 한국콜마(주)

세종특별자치시 전의면 산단길 245

제조의뢰자 : **일동제약주식회사**

본사 서울특별시 서초구 바우로27길 2 (전화)02-526-3114

공장 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실:(전화)080-022-1010(수신자 부담)