

# 비타민 종합영양제 벤포라민 정

분류번호:316  
일반의약품  
K G M P  
적격업체

## [성분·함량] 1정 중

- 유효성분 : 피리독신염산염(KP) ----- 50mg  
d-비오틴(USP) ----- 0.25mg  
시아노코발라민(KP) ----- 0.05mg  
토코페롤아세테이트 2배산(비타민E로서 10 IU)(BP) ----- 20mg  
폴산(KP) ----- 0.2mg  
벤포티아민(티아민염산염으로서 36.15mg)(KP) ----- 50mg  
니코틴산아미드(KP) ----- 50mg  
판토텐산칼슘(KP) ----- 50mg  
산화아연(아연으로서 15mg)(KP) ----- 18.7mg  
아스코르브산과립(아스코르브산으로서 50mg)(별규) ----- 51.55mg  
우르소데옥시콜산(KP) ----- 15mg  
이노시톨(KP) ----- 50mg  
리보플라빈(KP) ----- 50mg  
콜린타르타르산염(DAB) ----- 50mg  
셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 25 µg)(KP) ----- 46.3mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 II 갈색(85F465001), 전분글리콜산나트륨, 카르나우바, 폴리디드성산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스, 히드로젤로오스

## [성상] 갈색의 타원형 필름코팅정

### [효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 E, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>, C의 보급
  - 육체피로
  - 임신·수유기
  - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력자하
  - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
  1. 비타민 B<sub>1</sub>(벤포티아민)
    - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)
    - 각기
    - 눈의 피로
  2. 비타민 B<sub>2</sub>(리보플라빈), 비타민B<sub>6</sub>(피리독신염산염)
    - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 아연의 보급

## [용법·용량] 만 12세 이상 청소년 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

### [사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
  - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
  - 2) 만 12개월 미만의 영아
  - 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
  - 1) 인삼, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
  - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
  - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
  - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
  - 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나) 대장염 등의 위장질환 환자

- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
  - 6) 신장(콩팥)장애 환자
  - 7) 저단백혈증 환자
  - 8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담이 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우  
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 설사, 피부염, 팜·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 구토, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 구역, 저혈압, 폐부종(부기)
  - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
  - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
  - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
  - 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
  - 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B<sub>12</sub>를 1일 10mg이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
  - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
  - 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 우혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
  - 9) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 할 것.
  - 10) 우발적으로 과량복용한 경우
  - 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
  - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
  - 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
  - 4) 요를 항색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
  - 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
  - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
  - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

## [저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

## [포장단위] 56정, 112정

- ※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 우수의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 변태 또는 오염 및 손상되거나 사용기한이 경과된 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품사전(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 본 제품 첨부문서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.arlico.co.kr](http://www.arlico.co.kr))의 제품정보 또는 학술정보문의(080-585-0004)를 통해 확인할 수 있습니다.